

# Parassikil

COLLARE 150 mg/g  
antiparassitario per cani

Collare antiparassitario  
per CANI di TAGLIA PICCOLA e MEDIA

Formevet

# Parassikil

COLLARE 150mg/g



PROTEZIONE DI LUNGA DURATA



7 MESI CONTRO LE ZECHE - 10 MESI CONTRO LE PULCI

## Parassikil Collare, 150mg/g - Collare antiparassitario per cani

**INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE** - 100 g di collare contengono: **Principio attivo:** Diazinone 15 g. **FORMA FARMACEUTICA** - Collare antiparassitario. **SPECIE DI DESTINAZIONE** - Cani. **INDICAZIONI** - Trattamento delle infestazioni da zecche e pulci nel cane. Il collare PARASSIKIL COLLARE assicura una protezione permanente di lunga durata, fino a 7 mesi contro le zecche e 10 mesi contro le pulci. **MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE** - Utilizzare un collare per animale. Applicare il collare intorno al collo dell'animale regolandolo in modo che non ci siano più di 2 dita di distanza. Eliminare la lunghezza in eccesso, tenendo conto della prevista crescita dell'animale. Il collare non teme l'umidità e le sue proprietà non sono alterate se bagnato. **TEMPO DI ATTESA** - Non pertinente. **AVVERTENZE SPECIALI - Controindicazioni** - Non usare su femmine in gestazione od allattanti. Non usare su animali malati o convalescenti. Non usare su cuccioli di meno di 3 mesi d'età. Non usare su animali con estese lesioni della pelle. Non usare in caso di ipersensibilità accertata al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **Precauzioni speciali per l'impiego negli animali** - Durante i primi giorni di utilizzo si consiglia di controllare il collo dell'animale. Togliere immediatamente il collare ai primi segni di irritazione o di reazioni avverse. È necessario un controllo continuativo dell'integrità del collare lungo tutto il periodo di permanenza a contatto con l'animale. **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali** - Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver manipolato il collare. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non inalare né ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande e recipienti destinati a contenerli. Non aprire la confezione prima dell'uso. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con gli occhi. Il prodotto è tossico per ingestione, inalazione e contatto con la pelle. In caso di incidente contattare un medico e mostrargli l'etichetta. Il diazinone è un composto organofosforico. Le persone che lavorano con le acetilcolinesterasi, per ragioni mediche, non devono manipolare il collare. Le persone con nota ipersensibilità alle sostanze contenute nel collare devono evitarne il contatto. **Reazioni avverse (frequenza e gravità)** - Può apparire una debole irritazione cutanea dovuta allo sfregamento del collare. Si consiglia di rimuovere il collare all'animale fino alla scomparsa dei sintomi. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario. **Impiego durante la gravidanza, l'allattamento** - Non usare su femmine in gestazione o allattanti. **Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione** - Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari, organofosforici o carbamati, mentre il collare è indossato e nei 14 giorni successivi all'asportazione. **Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)** - Non superare le dosi consigliate. I sintomi d'intossicazione sono: dispnea, salivazione, rigidità delle articolazioni. In caso d'ingestione o masticazione, consultare immediatamente un veterinario e se possibile, mostrargli l'etichetta. In caso d'intossicazione grave, iniettare solfato d'atropina (0,2 mg/kg) in funzione del peso del soggetto. **PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE** - Conservare nella confezione d'origine a temperatura inferiore a 25 °C. **PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI** - I collari utilizzati e non utilizzati e tutti i residui di prodotto devono essere conferiti negli abituali punti di raccolta per i farmaci scaduti o inutilizzati. Non smaltire nei rifiuti domestici, nei corsi d'acqua, negli stagni o nel terreno. **SOLO PER USO VETERINARIO - TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI - NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO** - VIRBAC - 1<sup>re</sup> Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 CARROS - FRANCE - Tel: +33 (0)4 92087304 - fax: +33 (0)4 92087348 - A.I.C. N°103578047 **Distributore per la vendita in Italia:** FORMEVET S.r.l. - Via Savona, 97 - 20144 Milano - Tel: +39 (0)2 4345891 - fax: +39 (0)2 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it - **La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.**  
Data di revisione del testo: settembre 2013

**CONFEZIONE** - Collare nero da 30 g.

Parassikil  
COLLARE 150 mg/g  
antiparassitario per cani

A/0714

A103578047



Parassikil  
COLLARE 150 mg/g  
antiparassitario per cani

8 0336381272312

