

# STRIKE®

200 mg/g

## pyrantel pamoato granulato per uso orale per equini

### **Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:**

ACME s.r.l. - Via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (RE)

### **Titolare dell'Autorizzazione alla Produzione Responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:**

ACME DRUGS s.r.l. - Via Portella della Ginestra, 9/A - 42025 Cavriago (RE)

STRIKE® 200 mg/g granulato per uso orale per equini

Pyrantel Pamoato

### **INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

Un g di granulato contiene:

#### **Principio attivo:**

Pyrantel pamoato 200 mg (equivalenti a pyrantel base 69,4 mg);

### **INDICAZIONI**

Trattamento delle infestazioni gastrointestinali degli equini sostenute da Strongili (es. *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equinus*, *Strongylus edentatus*).

### **CONTROINDICAZIONI**

L'impiego del pyrantel è sconsigliato negli animali gravemente debilitati.

Non usare in caso di ipersensibilità nota ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

### **REAZIONI AVVERSE**

Gli effetti indesiderati più frequentemente osservati sono correlati con l'apparato gastrointestinale in particolare: anoressia, vomito, diarrea. Nei soggetti gravemente debilitati gli effetti nicotinici del pyrantel risultano maggiormente pronunciati.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

### **SPECIE DI DESTINAZIONE**

Equini.

### **POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Via di somministrazione: orale

Posologia:

Somministrare 25 g di granulato ogni 250 kg di peso dell'equino (10 grammi ogni 100 kg di peso) in unica somministrazione.

### **AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Somministrare in unica somministrazione.

### **TEMPO DI ATTESA**

Carne e visceri: zero (0) giorni

## **PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Proteggere il medicinale dalla luce.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla scatola.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: barattolo da 1000 g; usare entro 180 giorni.

Tenere il barattolo ben chiuso per proteggerlo dalla luce e dall'umidità.

## **AVVERTENZE SPECIALI**

### **Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Al fine di ottenere un efficace controllo dei parassiti, il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico sulle feci. Può svilupparsi resistenza da parassiti a qualsiasi particolare classe di antelmintici dopo un uso frequente e ripetuto.

### **Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

Negli animali debilitati o fortemente infestati, il prodotto deve essere usato solo dopo una valutazione del rischio / beneficio del veterinario.

Emorragie digestive (diarrea, feci sanguinolente) possono derivare dal trattamento con antelmintici in caso di infestazioni pesanti.

Il principio attivo non è noto per causare particolari effetti avversi negli animali giovani.

### **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali**

Evitare il contatto con la cute, gli occhi o la bocca.

Indossare dei guanti per somministrare il prodotto.

In caso di contatto accidentale lavare le mani accuratamente.

Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione.

In caso di ingestione, versamento sulla cute, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Le persone con nota ipersensibilità al pyrantel pamoato devono evitare contatti con il medicinale veterinario e somministrare il prodotto con cautela.

### **Impiego durante la gravidanza, l'allattamento**

Può essere usato durante tutte le fasi della gravidanza e della lattazione.

### **Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione**

Nei soggetti particolarmente debilitati la concomitante associazione di altri farmaci colinergici quali il levamisolo, può generare potenziamento della tossicità del pyrantel. Non usare contemporaneamente con piperazina, in quanto gli effetti antelmintici del pyrantel possono essere contrastati dalla piperazina.

### **Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario**

La somministrazione del farmaco fino a 3 volte la dose terapeutica autorizzata è risultata ben tollerata.

A dosi superiori, i sintomi dovuti ad iperdosaggio sono costituiti da marcata tachipnea, profusa sudorazione, scialorrea, atassia motoria.

Le procedure di emergenza consistono nella somministrazione di farmaci antagonisti dell'acetilcolina.

### **Incompatibilità**

Non note

**Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti**

**Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo:** Settembre 2011