



## SLURP TREATMENT

*La funzionalità intestinale*

Mangime complementare in polvere per cavalli che idrata il contenuto intestinale favorendo il transito enterico e l'evacuazione fecale. Deterge le pareti intestinali e lenisce l'irritazione della mucosa. Slurp treatment è composto da semi di lino cotti, orzo, granturco, farinaccio di frumento, pyllium polvere, erba medica disidratata ad alta temperatura, carrube essiccate, inulina di cicoria e glucosio.

## COMPOSIZIONE

### ANALISI CHIMICA

Proteina grezza	9 %
Fibra grezza	11,28 %
Oli e grassi grezzi	8,44 %
Ceneri grezze	2,14 %
Sodio	0,00 %
Umidità	10,8 %

## ADDITIVI PER KG

### Promotori della digestione

(4a1704) Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 5 x 10<sup>8</sup> CFU

## CONSERVANTI

(E296) DL-Acido Malico	500 mg
(1a297) Acido Fumarico	1000 mg
(E330) Acido Citrico 80000 mg	500 mg

## PROPRIETÀ

Slurp treatment è consigliato per: favorire la rimozione di sabbia o di terra dall'intestino, idratare il contenuto intestinale e favorire la risoluzione delle coliche da costipazione, ripristinare e regolarizzare l'attività enterica in seguito a coliche da costipazione. Può essere utilizzato per ripristinare il regime alimentare normale nei soggetti convalescenti da interventi chirurgici sull'intestino.

## ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Le dosi si riferiscono al prodotto in polvere non ancora ricostituito con acqua. Versare il contenuto del barattolo in 6 litri d'acqua calda, mescolare fino a completo scioglimento e somministrare tiepido.

Non somministrare secco. Lasciare libero accesso all'acqua di abbeverata. Nei soggetti inappetenti somministrare mediante sonda rino-esofagea.

**Per favorire il ripristino della funzione intestinale in soggetti convalescenti da interventi chirurgici** dal secondo giorno di convalescenza somministrare un barattolo al dì, fino al ripristino della normale funzione intestinale.

**Nei soggetti con accumulo di sabbia o terra nel colon**

somministrare un barattolo una volta al giorno per almeno 7 giorni consecutivi. Completare la razione giornaliera con abbondante somministrazione di fieno inzuppato d'acqua.

**Nei soggetti con colica intestinale da costipazione della massa fecale** somministrare un barattolo diluito in almeno 6 litri di acqua tiepida per sonda rino-esofagea.

Rimuovere i residui dalla mangiatoia

## CONFEZIONI

Barattolo da 800 g di polvere