

COMPOSIZIONE:

Glucosio
Cloruro di Potassio
Cloruro di Sodio

ADDITIVI:

Formiato di Sodio (E237), Diacetato di Sodio (E262).

COMPONENTI ANALITICI:

Umidità: 51%
Ceneri grezze: 30%
Sodio: 11.5%
Cloruri: 8.6%
Potassio: 4.5%
Proteine grezze: 0%
Fibre grezze: 0%
Oli e grassi grezzi: 0%

INDICAZIONI:

Vitelli. Rehydion® gel è indicato per prevenire o compensare le perdite di acqua e di elettroliti in caso di disidratazione dovuta a disturbi digestivi in presenza di diarrea. Si raccomanda di consultare un medico veterinario prima della somministrazione.

PROPRIETÀ:

Rehydion® gel è molto pratico e può essere diluito nel latte. La composizione è bilanciata in agenti alcalinizzanti, elettroliti ed energia, senza alterare la digestione del latte. Rehydion® gel è altamente appetibile e può essere assunto senza interruzione dell'alimentazione latte.

rehydion®

Gel



Mangime
complementare
per prevenire o
compensare le
perdite di acqua e
di elettroliti

Contenuto netto 320 ml

ISTRUZIONI D'USO E DOSAGGIO:

Uso orale.

- Agitare bene il flacone prima dell'uso. Preparare una soluzione fresca prima di ogni somministrazione. Rimuovere il tappo e premere la bottiglia sino a misurare 20 ml nella sua parte superiore.
- Mescolare 20 ml di Rehydion® gel in 1 litro di latte tiepido o acqua.
- Per mantenere i corretti livelli di elettroliti, somministrare 2 litri di latte (o acqua) contenenti Rehydion® gel due volte al giorno per due giorni o più, se necessario. Una bottiglia di Rehydion® gel permette di trattare 2 vitelli per due giorni oppure un vitello per 4 giorni.

Scad.:

Lotto n.:

Produttore:
a DE-BY-I-00022

C3062 ABCDE
59910



Ceva Salute Animale SpA,
Viale Colleoni 15
20864 Agrate Brianza (MB)

