

**Chemisole, 25 mg/ml soluzione orale**  
per uso in acqua da bere per colombi viaggiatori e da competizione  
(levamisolo)

**COMPOSIZIONE**

Ogni ml di soluzione contiene:

*Principi attivi:*

levamisolo                    mg 25

*Eccipienti:*

sodio metabisolfito

metil p-idrossi-benzoato

**SPECIE DI DESTINAZIONE**

Colombi viaggiatori e da competizione.

**VIA E MODO DI SOMMINISTRAZIONE**

Per via orale, diluito nell'acqua di bevanda.

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

Infestazioni singole o miste sostenute da forme adulte e larvali di *Ascaridia spp*, *Capillaria spp.*, *Heterakis spp.* e *Syngamus trachea*.

**POSOLOGIA E METODO DI SOMMINISTRAZIONE**

**Confezione da 25 ml:**

5 - 10 ml per litro di acqua da bere (pari a circa 20 - 25 mg di levamisolo/kg p.v.), somministrazione unica della durata di 1 giorno (12 ore). La siringa dosatrice presente nel tappo corrisponde a 1 ml.

**Confezione da 100 ml:**

5 - 10 ml per litro di acqua da bere (pari a circa 20 - 25 mg di levamisolo/kg p.v.), somministrazione unica della durata di 1 giorno (12 ore). La dose corrisponde a circa 20 gocce versate in 100 - 200 ml di acqua.

**N.B.** Si consiglia di ripetere il trattamento a distanza di 12 giorni dal primo, al fine di colpire tutte le forme emergenti non aggredite con il primo intervento.

**Metodo di somministrazione:**

togliere dagli abbeveratoi la bevanda non medicata e somministrare quella medicata. Quindi ripristinare la bevanda non medicata. Sarebbe opportuno lasciare assetare gli animali per qualche ora prima di somministrare la bevanda medicata.

**AVVERTENZE**

Evitare la somministrazione contemporanea di antielmintici ad azione nicotinosimile (es. pyrantel tartrato). Il levamisolo non deve essere impiegato insieme agli esteri organofosforici ed ai carbammati.

E' buona norma evitare il contatto diretto con il prodotto durante la sua manipolazione.

Nella manipolazione del prodotto si dovrà utilizzare una speciale attrezzatura protettiva composta da indumenti protettivi, guanti e mascherina. Non inalare, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

In caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua e sapone. Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione; lavare le mani dopo l'uso.

Le persone con nota ipersensibilità al principio attivo o all'eccipiente, devono evitare il contatto con il medicinale veterinario.

Non superare le dosi consigliate.  
Non usare in colombi in ovodeposizione.

**Il prodotto non deve essere somministrato a colombi destinati al consumo alimentare umano**

### **CONTROINDICAZIONI**

Non somministrare il preparato ad animali con insufficienza epatica.

### **REAZIONI AVVERSE**

I volatili che soffrono di gravi infestazioni da nematodi broncopolmonari possono presentare rantoli e tosse per parecchie ore, causati dalla rimozione dei vermi dai polmoni.

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questa etichetta o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

### **PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO**

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Dopo apertura utilizzare entro 3 mesi.

L'acqua medicata deve essere consumata entro 12 ore.

I medicinali non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici ma devono essere conferiti negli idonei sistemi di raccolta e smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**Confezione da 25 ml: DA VENDERSI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICO – VETERINARIA.**

**Confezione da 100 ml: DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO – VETERINARIA RIPETIBILE.**

### **SOLO PER USO VETERINARIO**

### **NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Confezione da 25 ml: AIC n. 103568010

Confezione da 100 ml: AIC n. 103568022.

### **TITOLARE DELL'A.I.C. E PRODUTTORE:**

Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì.