

Etichetta esterna/foglio illustrativo

**FRONTLINE® SPRAY**  
(Fipronil 0,25%)  
100 ml  
**CANI - GATTI**

**PER USO ESTERNO**

**COMPOSIZIONE**

**Principio attivo:**

Fipronil 0,25 g

***Eccipienti:*** q.b. a 100 ml

**INDICAZIONI**

Trattamento e prevenzione delle infestazioni da **zecche**, da **pulci** e da **pidocchi** nei cani e nei gatti di 2 giorni, o più, di età.

- Il fipronil esplica rapidamente la sua azione letale sulle **zecche**, impedendo lo sviluppo del parassita e l'eventuale trasmissione di infezioni di cui la zecca sia vettore. E' attivo contro le principali specie di zecche presenti sul territorio nazionale, tra cui *Ixodes ricinus*, responsabile della trasmissione della malattia di Lyme al cane, al gatto e all'uomo.
- Il fipronil agisce sulle **pulci** uccidendo rapidamente le forme adulte, prevenendo così la deposizione di uova e quindi nuove infestazioni. Grazie all'azione letale sulle pulci adulte, il fipronil contribuisce efficacemente al controllo ed alla risoluzione della Dermatite Allergica da Pulci (DAP) che, nel cane e nel gatto, è provocata dall'azione sensibilizzante esercitata dagli antigeni contenuti nella saliva di tali parassiti.
- Il fipronil inoltre, con un singolo trattamento, controlla e risolve in modo rapido e definitivo le infestazioni da **pidocchi** nel cane e nel gatto, in particolare quelle provocate da *Trichodectes canis*, pidocchio masticatore del cane e da *Felicola subrostratus*, pidocchio masticatore del gatto

**APPLICAZIONE CONSIGLIATA:** 6-12 nebulizzazioni per ogni kg di peso.

**POSOLOGIA**

In funzione della lunghezza del pelo, nebulizzare da 3 a 6 ml di prodotto/kg di peso. Tale volume corrisponde a 6-12 nebulizzazioni (1 erogazione è pari a 0,5 ml) per ogni kg di peso.

Un'unica applicazione del prodotto protegge l'animale da nuove infestazioni da **zecche**, da **pulci** e da **pidocchi**, in particolare:

- da zecche: fino ad 1 mese dopo il trattamento sia nel cane che nel gatto
- da pulci: \* fino a 3 mesi dopo il trattamento nel cane  
\* fino a 5 settimane dopo il trattamento nel gatto

Per una corretta prevenzione ectoparassitaria è consigliabile effettuare trattamenti mensili nei periodi di maggiore stagionalità

#### **VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Uso esterno: mediante nebulizzazione

#### **MODALITA' D'USO**

Nebulizzare "contropelo" tutta la superficie del corpo dell'animale, da una distanza di 10-20 cm, tenendo il flacone in posizione verticale.

La nebulizzazione va praticata in modo omogeneo, così da "bagnare" uniformemente il pelo di tutto il corpo.

Al termine della nebulizzazione, frizionare accuratamente il dorso, le spalle, i fianchi, l'addome, le zampe ed il collo per far arrivare il prodotto a diretto contatto con la cute.

Per la testa e l'area attorno agli occhi, applicare il prodotto su un guanto e passarlo delicatamente "contropelo" su queste parti.

Al termine di queste operazioni, lasciare asciugare naturalmente.

Il fipronil si concentra nelle ghiandole sebacee dei follicoli piliferi, nelle 24 ore successive all'applicazione.

I bagni, la pioggia, gli shampoo non interferiscono sulla durata d'attività del prodotto nei confronti degli ectoparassiti.

#### **CONTROINDICAZIONI**

Non usare su animali con estese lesioni della pelle.

Non utilizzare in animali malati (malattie sistemiche, con febbre...) o convalescenti.

Non usare nei conigli, poiché potrebbero manifestarsi reazioni avverse potenzialmente mortali.

#### **EFFETTI COLLATERALI**

*Qualora gli animali si leccino, si può osservare una transitoria ipersalivazione dovuta principalmente agli eccipienti del prodotto.*

Tra gli estremamente rari fenomeni di sospette reazioni avverse, sono state descritte transitorie reazioni cutanee come eritema, prurito o alopecia dopo applicazione. Eccezionalmente, sono stati osservati ipersalivazione, sintomi neurologici reversibili (iperestesia, abbattimento, sintomi nervosi), vomito o sintomatologia respiratoria.

Non superare la dose consigliata.

#### **PRECAUZIONI D'USO**

Solo per uso esterno.

Evitare di spruzzare il prodotto negli occhi degli animali, sulle mucose e all'interno dell'orecchio.

I bagni, la pioggia, gli shampoo non interferiscono sulla durata dell'attività del prodotto nei confronti degli ectoparassiti.

E' importante che gli animali non si leccino l'un l'altro dopo il trattamento.

Si consiglia di non permettere ai cani di nuotare in corsi d'acqua nei 2 giorni successivi all'applicazione del prodotto poiché il fipronil può essere dannoso per gli organismi acquatici.

Se non correttamente applicato, singole zecche potrebbero attaccarsi al cane o al gatto. Per questa ragione, nel peggiore dei casi, non può essere completamente esclusa la trasmissione di malattie infettive.

Le pulci presenti sugli animali spesso infestano la cesta dell'animale, le coperte e le zone in cui l'animale vive, in particolare tappeti, tende e tessuti d'arredamento; questi, in caso di infestazioni massive e all'inizio del trattamento antiparassitario possono essere trattati con un insetticida apposito, e regolarmente ripuliti con un aspiratore.

## UTILIZZO DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

Il prodotto può essere usato nella cagna e nella gatta sia durante la gravidanza che durante il periodo dell'allattamento.

## AVVERTENZE

- Conservare lontano da fiamme o fonti di calore
--

- conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande
- durante l'uso non contaminare alimenti, mangimi, bevande o recipienti destinati a contenerli
- aerare adeguatamente l'ambiente, durante l'erogazione del prodotto
- per l'erogazione del prodotto, proteggere le mani con guanti
- non inalare, non ingerire né fare ingerire
- evitare il contatto con donne in stato di gravidanza e con bambini piccoli
- in caso di ingestione accidentale consultare un medico

Il prodotto può provocare irritazione alle mucose e agli occhi. Si consiglia quindi di evitare il contatto con la bocca e con gli occhi. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua.

Si consiglia di evitare il contatto con Frontline Spray agli animali o alle persone con sensibilità accertata nei confronti di insetticidi o alcool e di non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a che il pelo non sia asciutto.

Lavarsi le mani dopo l'utilizzo.

Non fumare, bere o mangiare durante l'applicazione.

## CONSERVAZIONE

In luogo fresco e asciutto e lontano da fiamme o fonti di calore

Lotto n.                      Scad.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato

A.I.C. n. 103029017 del Ministero della Salute

**PER USO VETERINARIO**

**TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE  
E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO**

Il prodotto non utilizzato o le confezioni vuote devono essere smaltite secondo la legislazione vigente.

Non contaminare stagni, corsi d'acqua o canali con il prodotto o con i contenitori vuoti.

Officina di produzione: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS - Tolosa (Francia)

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim AH IT S.p.A.