

# Propancat® 230/20 mg



compresse appetibili rivestite con film per gatti

## 1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSO

*Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:*

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italia

*Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:*

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea, Co. Galway, Irlanda

*Distributore per l'Italia:*

Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. s.r.l.

Ozzano Emilia (BO) Italia

## 2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Propancat 230/20 mg compresse appetibili rivestite con film per gatti

Pirantel embonato, Praziquantel

## 3. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Ogni compressa rivestita con film contiene:

**Principi attivi:**

Pirantel embonato 230 mg.

Praziquantel 20 mg.

Compresa rivestita con film, rotonda, biconvessa, di colore da bianco a biancastro, con linea di frattura su un lato e liscia sull'altro lato.

## 4. INDICAZIONI

Trattamento di infezioni miste sostenute da nematodi e cestodi delle seguenti specie:

Nematodi: *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*,

Cestodi: *Dipylidium caninum*, *Taenia taeniaeformis*,

*Echinococcus multilocularis*.

## 5. CONTROINDICAZIONI

Non usare contemporaneamente a composti a base di piperazina.

Non usare in gattini al di sotto delle 6 settimane di età.

Non usare in animali con ipersensibilità nota ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti.

## 6. REAZIONI AVVERSE

Nessuna nota.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario.

## 7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatti.

## 8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

### *Dosaggio*

La dose consigliata è: 20 mg/kg di pirantel (57,5 mg/kg di pirantel embonato) e 5 mg/kg di praziquantel. Equivalenti a 1 compressa per 4 kg di peso corporeo.

Peso corporeo	Compresse
1,0 - 2,0 kg	½
2,1 - 4,0 kg	1
4,1 - 6,0 kg	1 ½
6,1 - 8,0 kg	2

### *Somministrazione e durata del trattamento*

Somministrazione orale singola.

La compressa può essere somministrata direttamente al gatto o nascosta nel cibo.

In caso di infestazione da ascaridi, specialmente nei gattini, non ci si può aspettare un'eliminazione completa, pertanto è possibile che persista un rischio di infezione per l'uomo. Occorre quindi ripetere i trattamenti con un prodotto idoneo contro i nematodi a intervalli di 14 giorni fino a 2-3 settimane dopo lo svezamento.

## 9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Per assicurare un dosaggio corretto, il peso corporeo dell'animale deve essere determinato in maniera accurata.

## 10. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente

## 11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sul blister e sull'astuccio.

Le compresse divise e non utilizzate devono essere eliminate.

Conservare il blister nell'imballaggio esterno.

## 12. AVVERTENZE SPECIALI

**Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione**

Non usare durante la gravidanza, ma si può usare durante l'allattamento.

**Sovradosaggio**

In seguito a dosi 5 volte superiori a quella raccomandata, sono stati osservati segni di intolleranza, come ad esempio il vomito.

---

### **Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Le pulci sono gli ospiti intermedi di un tipo comune di tenia: *Dipylidium caninum*. L'infestazione da cestodi si ripresenterà sicuramente se non si attuano misure di controllo sugli ospiti intermedi quali pulci, topi, etc.

La resistenza di un parassita ad una particolare classe di antelmintici può svilupparsi in seguito ad uso frequente, ripetuto di un antelmintico.

### **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali**

Nel rispetto delle norme igieniche, lavarsi le mani dopo aver somministrato le compresse direttamente al gatto o dopo averle mescolate nel suo cibo.

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo.

### **13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

Chiedere al tuo medico veterinario/farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

### **14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

Dicembre 2016

### **15. ALTRE INFORMAZIONI**

#### **Confezioni**

Astuccio da 2 compresse.

Astuccio da 24 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

### **SOLO PER USO VETERINARIO**

Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.