



Lactolyte[®]

VITELLI

COMPOSIZIONE:

Per Kg:

Cloruro Rameico	0.70 mg
Cloruro Manganese	0.30 mg
Cloruro di Zinco	35.00 mg
Cloruro di Cobalto	0.20 mg

Il prodotto contiene inoltre:

Propionato di sodio	21.30 g
Cloruro di sodio	32.50 g
Cloruro di potassio	8.20 g
Acetato di sodio anidro	54.50 g
Cloruro di magnesio anidro	4.20 g
Fosfato acido di potassio	15.10 g

Supporto q.b.a. 1.000 g costituito da: siero di latte

INDICAZIONI :

La particolare concentrazione elettrolitica è stata opportunamente studiata per la preparazione di una soluzione bilanciata da impiegarsi come coadiuvante nelle sindromi diarroiche del vitello, allo scopo di reidratare e ristabilire il livello energetico dei soggetti trattati. Il siero di latte contenente grassi molto digeribili e proteine formate da aminoacidi essenziali, conferisce un alto apporto energetico e aumenta la ritenzione azotata nei giovani vitelli. Inoltre il lattosio presente nel siero consente al giovane vitello di riprendere la normale alimentazione latte, ciò che invece, con l'uso dei reidratanti sintetici, non sempre avviene.

POSOLOGIA E MODALITA' D'IMPIEGO:

Sciogliere il contenuto di una busta (90 g) in lt 2 di acqua a temperatura ambiente. Somministrare l'intero volume mediante poppatoio o sonda. Ripetere il trattamento 2 volte al giorno per 2 giorni, sospendendo la somministrazione di latte o succedanei del latte. Dopo il trattamento, riportare il vitello ad alimentazione completa con latte o succedanei.

SPECIE DI DESTIANZIONE :

Vitello

TEMPI DI SOSPENSIONE:

Carni: nessuno

AVVERTENZE: I titoli dichiarati si garantiscono per il prodotto contenuto nella confezione originale, sigillata e conservata in luogo fresco ed asciutto.

VALIDITA': 24 mesi dalla data di preparazione.

PRESENTAZIONE:

Busta da 90 g
Sacchetto da 4,5 Kg.

Riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali.

REGIME DI DISPENSAZIONE: Non sottoposto all'obbligo di ricetta medico-veterinaria

REIDRATANTE ENERGETICO FISIOLÓGICO