

Agita 10WG

Per il controllo delle mosche domestiche (*Musca domestica*) in ambienti zootecnici (indoor) da parte di utilizzatori professionali.

Composizione:

1 kg di prodotto contengono:

Thiamethoxam	g	100,00
Cis-tricos-9-ene	g	0,5
Coformulanti q .b. a	g	100

Granuli dispersibili in acqua.



ATTENZIONE. Contiene Thiamethoxam.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il contenuto / contenitore in un impianto d'incenerimento autorizzato.

Tossico per le api.

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)

**Autorizzazione del Ministero della Salute n.
IT/2018/00538**

Titolare dell'autorizzazione

Elanco Animal Health Inc.
Mattenstrasse 24A

4058 Basilea

Svizzera

Officina di produzione

Kwizda Agro GmbH
Werk Leobendorf B6 Laaer Straße,
Kwizda-Allee 1 2100
Leobendorf Austria

Confezione:

Flacone HDPE da 100 g – 5 kg

Sacchetto laminato prestampato in PET/Alu/PET/PE - 25 x 20 g in scatola di cartone rigida

Validità: 2 anni

Lotto n. del

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Indicazioni di primo soccorso:

Assicurarsi che il personale medico sia al corrente dei materiali coinvolti, e prenda le necessarie precauzioni per proteggersi. Muovere le persone colpite dalla zona di pericolo verso un luogo ben ventilato o all'aria aperta e prevenire ipotermia.

Inalazione: Muovere all'aria fresca. Chiamare un medico se i sintomi compaiono o sono persistenti.

Cutanea: Lavare con sapone ed acqua. Consultare un medico se si sviluppa un'irritazione persistente. Sciacquare immediatamente con abbondante acqua e sapone mentre si rimuovono indumenti e calzature contaminati.

Contatto con gli occhi: Sciacquare con acqua. Consultare un medico se si sviluppa un'irritazione persistente. Sciacquare gli occhi con acqua pulita per alcuni minuti.

Ingestione: Sciacquare la bocca. Contattare un medico se si verificano dei sintomi. Se ingerito, contattare immediatamente un medico e mostrare il contenitore o l'etichetta. Non si conosce alcun antidoto specifico! Applicare una terapia sintomatica.

In caso di rilascio accidentale, fermare il flusso di materiale se ciò è possibile senza rischio. Arginare tutt'intorno la fuoriuscita per il successivo smaltimento. Una volta recuperato il prodotto, sciacquare l'area con acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE (*Technical characteristics*)

Questo prodotto non deve essere usato continuativamente contro le mosche in ambienti zootecnici intensivi o controllati poiché ciò può causare il fallimento del trattamento per resistenza all'insetticida.

Il thiamethoxam è l'ingrediente attivo di AGITA 10WG, che appartiene alla classe dei neonicotinoidi, ha un meccanismo d'azione differente da altre classi di insetticidi come piretroidi e organofosforici.

L'utilizzo su pannelli sospesi assicura che la maggior parte dell'ambiente zootecnico non sia trattato riducendo così la probabilità di contatto con un residuo sub-letale. Inoltre, per minimizzare le possibilità di sviluppare resistenza in futuro, si consiglia di evitare l'utilizzo di AGITA 10WG esclusivamente e continuativamente come unico agente per il controllo delle mosche.

AGITA 10WG deve essere utilizzato come un componente di un programma di disinfestazione integrato che prevede prodotti di classi chimiche e non chimiche diverse (ad esempio, zanzariere, pratiche sanitarie).

ORGANISMO TARGET/s

Mosca domestica (*Musca domestica*)

MODALITÀ APPLICATIVE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

Il prodotto contiene thiamethoxam che è tossico per le api.

Solo per uso professionale.

Solo per uso interno.

Tenere lontano da cibo, bevande e alimenti zootecnici.

Rimuovere alimenti e mangimi non coperti prima dell'applicazione.

Applicare fuori dalla portata di bambini e animali.

Miscelare e mescolare la quantità indicata di AGITA 10WG nel corrispondente volume di acqua tiepida in un contenitore separato. Utilizzare il contenitore che abbia un volume pari ad 1/3 più grande del quantitativo di acqua da aggiungere ed aspettare che si formi schiuma prima di applicare (tramite pennello/ruolo).

Il prodotto deve essere applicato unicamente su pannelli sospesi.

Applicare unicamente su pannelli sospesi non adsorbenti che devono poi essere fissati alle pareti o soffitti dove le mosche preferiscono riposare.

Non applicare il prodotto direttamente sulle superfici (ad esempio, pareti) dell'edificio.

Per il mescolamento/caricamento e per l'applicazione, l'applicatore deve indossare indumenti monouso (ad esempio camicia in carta, grembiule, tuta da lavoro) per evitare

emissioni nel sistema di fognatura al lavaggio degli indumenti contaminati.

Lavare le mani e la cute esposta immediatamente dopo la manipolazione del prodotto.

L'area, dove avviene il mescolamento/caricamento e l'applicazione dei pannelli sospesi deve essere coperta con fogli di plastica monouso per evitare la contaminazione delle superfici e pavimenti adiacenti.

Non pulire l'area trattata.

Rimuovere tutti i pannelli sospesi che sono trattati con il prodotto biocida prima della pre-pulitura e/o disinfestazione.

L'attrezzatura utilizzata per l'applicazione (ad esempio pennelli, rulli, pannelli sospesi) non deve essere pulita dopo l'uso. Tutta l'attrezzatura utilizzata può essere riutilizzata senza essere pulita (se possibile) e va sempre smaltita in accordo con le disposizioni locali (non smaltire nelle acque reflue).

Il prodotto deve essere utilizzato in combinazione con un larvicida ed alternata ad un adulticida con un diverso meccanismo d'azione.

Se ciò non fosse efficace, riferire al titolare dell'autorizzazione.

INDICAZIONI PER L'USO

AGITA 10WG è una formulazione adatta al controllo delle mosche adulte in ambienti zootecnici, inclusa la gestione di avicoli, suini e ruminanti, stalle, il trasporto di animali, gli allevamenti o altre aree associate dove è necessario il controllo delle mosche domestiche.

Il prodotto deve essere applicato dove si osserva che le mosche si fermano comunemente a nutrirsi o riposarsi, come ad esempio davanzali di finestre, superfici di pareti, divisori di gabbie e pavimenti. Il prodotto deve essere applicato unicamente tramite pannelli sospesi.

DOSI DI APPLICAZIONE

Diluizione: disperdere 100 g di prodotto in 80 ml di acqua. Applicare il prodotto disperso (tramite pennello/rullo) su 10 pannelli sospesi da 20 cm x 30 cm. Appendere 10 pannelli sospesi per una superficie di parete di 80-120 m².

L'applicazione può essere ripetuta ogni 6 settimane. Il prodotto può richiedere 4 settimane per essere efficace. Ritrattare l'area solamente dopo almeno 6 settimane. Riapplicare se la polvere ha ricoperto l'area trattata o se gli insetti hanno consumato l'esca.

AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

Eliminazione del contenuto/contenitore in conformità di un impianto di incenerimento autorizzato.

Residui del prodotto applicato, le acque di lavaggio degli strumenti di applicazione o altri residui (ad esempio, confezioni vuote, pannelli esauriti) devono essere smaltiti in accordo con le disposizioni locali. Non smaltire alcuno prodotto di scarto o acque reflue degli strumenti di applicazione nelle acque di scarico.

ALTRE INFORMAZIONI

Tenere il contenitore chiuso.

Proteggere dalla luce e dall'umidità.

Temperatura di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.