

VETEMUCIL® N-ACETILCISTEINA 33,3%

— GRANULATO ad uso orale per equidi, suini, vitelli —

Nome e indirizzo del Titolare A.I.C.: ACME srl
Via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (RE)
Nome e indirizzo del Titolare dell'Autorizzazione
alla Produzione Responsabile del rilascio dei lotti
di fabbricazione: ACME DRUGS s.r.l.
Via Portella della Ginestra, 9/A - 42025 Cavriago (RE)

**INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI
ALTRI INGREDIENTI:** una bustina da 3 g contiene:
Principio attivo: N-Acetilcisteina 1 g

INDICAZIONI: terapia delle forme cliniche a carico
dell'apparato respiratorio con presenza di secrezio-
ni mucose o mucopurulente quali laringo-tracheiti,
bronchiti e broncopolmoniti acute e croniche.

CONTROINDICAZIONI: nessuna nota. Non usa-
re in caso di ipersensibilità al principio attivo o
all'eccepiante.

REAZIONI AVVERSE: nessuna nota.
Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi
o altre reazioni non menzionate in questo foglietto
illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

SPECIE DI DESTINAZIONE: Equidi, suini, vitelli

**POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ
DI SOMMINISTRAZIONE:**

Via di somministrazione: orale

Posologia:

Vitelli e puledri: 10 mg di acetilcisteina/Kg di p.v./die.

Equini adulti: 5-10 mg di acetilcisteina/Kg di p.v./die.

Suini: 10-20 mg di acetilcisteina/Kg di p.v./die.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE:

il contenuto della bustina può essere somministrato sciolto
nell'acqua di bevanda o nel latte.

Il lieve odore sulfureo che si avverte aprendo la busta è
caratteristico della sostanza e non pregiudica l'utilizza-
bilità del preparato, quanto ad efficacia ed innocuità.
Inoltre ogni possibilità da parte delle carni di prendere
tale odore è esclusa dalla rapida metabolizzazione cui
l'acetilcisteina è sottoposta nell'organismo. L'intensa
fluidificazione del secreto bronchiale è dimostrata da un
aumento della tosse, dei rumori respiratori ecc., nei primi
giorni di trattamento, cui fa seguito in genere una loro
riduzione fino alla scomparsa, con conseguente deterzione
delle vie respiratorie.

TEMPO DI ATTESA: zero giorni

**PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVA-
ZIONE:** conservare al riparo dell'umidità.

AVVERTENZE SPECIALI

**Avvertenze speciali per ciascuna specie di destina-
zione:** non è previsto l'uso di VETEMUCIL GRANU-
LATO nei ruminanti adulti con rumine funzionante.
In caso di processi infettivi in atto è opportuno,
dietro valutazione del medico veterinario, associare
al mucolitico un trattamento antibiotico o sulfami-
dico generale.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:
nessuna.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate
dalla persona che somministra il prodotto agli
animali:** nessuna. Le persone con nota ipersensi-
bilità al principio attivo devono somministrare il
prodotto con cautela.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento:
può essere usato durante la gravidanza e l'allatta-
mento nella specie equina e suina.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre

forme d'interazione: nessuna conosciuta.

**Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antido-
ti) se necessario:** non sono stati osservati segni e sintomi
particolari anche dopo somministrazioni di dosi elevate.

Incompatibilità: nessuna nota.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

**Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati
da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità
alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei
sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non
utilizzati o scaduti.**

Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo:

Giugno 2009

