

Nemex[®]
(pyrantel pamoato)
Pasta per gatti

Antielmintico per uso orale
Per uso Veterinario

COMPOSIZIONE

Ogni grammo di pasta contiene:

- principio attivo: pyrantel pamoato 115,30 mg (pari a 40,00 mg di pyrantel base)
- eccipienti: q.b. a 1 grammo

SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatti

PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Proprietà farmacodinamiche

Il pyrantel pamoato è un composto antielmintico appartenente alla classe delle tetraidropirimidine. Possiede un ampio spettro di attività nei confronti dei principali nematodi gastrointestinali degli animali e dell'uomo.

Nella formulazione per gatti si è dimostrato efficace contro i seguenti parassiti presenti nel tratto gastrointestinale di gatti adulti e gattini:

- *Toxocara cati*
- *Toxascaris leonina*
- *Uncinaria stenocephala*
- *Ancylostoma caninum*
- *Ancylostoma braziliense*
- *Ancylostoma tubaeforme*

Il meccanismo d'azione del pyrantel si basa su un potente antagonismo a livello dei recettori dell'acetilcolina (Ach) presenti sulle cellule muscolari dei nematodi che induce un blocco neuromuscolare tipico degli agenti depolarizzanti. Ne risulta una paralisi spastica del parassita che viene espulso dall'intestino dell'ospite.

Proprietà farmacocinetiche

Il pyrantel pamoato è un sale relativamente insolubile e scarsamente assorbito dall'intestino. La sua attività è limitata ai parassiti presenti nel tratto intestinale. La piccola quantità di pyrantel assorbita dal circolo ematico viene rapidamente metabolizzata, i metaboliti derivanti non hanno potenzialità tossiche.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Nemex[®] pasta per gatti è indicato per la terapia e la prevenzione delle infestazioni da ascaridi ed ancilostomi in gattini, gatte in gravidanza ed allattamento e gatti adulti.

CONTROINDICAZIONI

Nessuna nota.

EFFETTI INDESIDERATI

Nessuno conosciuto.

UTILIZZO IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Il prodotto è specificatamente indicato per l'uso in gravidanza e durante l'allattamento. Nel corso di prove cliniche che hanno utilizzato dosaggi più elevati rispetto a quelli raccomandati non sono stati riscontrati o segnalati effetti collaterali.

MODO D'IMPIEGO E POSOLOGIA

Nemex[®] va somministrato in un'unica volta senza tenere a digiuno il gatto e senza far rispettare ad esso una particolare dieta. L'appetibilità di Nemex[®] permette di spalmare il preparato direttamente sui denti o su una zampa del gatto con l'apposito iniettore o direttamente nel cavo orale dell'animale. In caso di animali poco socievoli o irrequieti Nemex[®] può essere somministrato mescolato al cibo.

Dose: unica somministrazione di 57,65 mg di pyrantel pamoato / kg di peso corporeo pari a 2 tacche della siringa da 2 g o 1 tacca della siringa da 3 g.

Il contenuto di una siringa da 2 g è sufficiente per un gatto di 4 kg di peso.

Il contenuto di una siringa da 3 g è sufficiente per un gatto di 6 kg di peso.

Modalità di somministrazione: per praticità di impiego, si consiglia la seguente posologia:

Profilassi:

la profilassi si effettua per mantenere il gatto libero da vermi. Inoltre il trattamento profilattico con Nemex[®] permette che il gatto:

- Sia più resistente alle altre malattie;
 - Sopporti maggiormente gli stress;
 - Presenti un sensorio più vigile;
 - Sia di aspetto generale migliore, in particolare presenti pelo più lucido.
1. **Gattini** (fino a 12 settimane di età): un primo trattamento va effettuato a 10 – 14 giorni di età. I trattamenti successivi vanno praticati ad intervalli settimanali fino a 2 – 3 settimane dopo lo svezzamento (circa 5 – 7 settimane di età). Persistendo ancora la probabilità di infestazione è consigliabile procedere ad ulteriori trattamenti fino alla 12^a settimana di età ad intervalli di 2 settimane.
 2. **Gatti giovani ed adulti** (dopo le 12 settimane di età): procedere a trattamenti regolari ogni 3 mesi. In condizioni igieniche e/o ambientali carenti, tali da favorire la possibilità di infestazione più frequente, è opportuno ripetere i trattamenti ad intervalli di tempo più ravvicinati.
 3. **Gatte:** provvedere al trattamento 2, 4, 6 settimane dopo ciascun calore. Le gatte che hanno partorito devono essere trattate alla 2^a, 4^a, 6^a, 8^a e 10^a settimana dopo il parto. Al di fuori di tali periodi ed in buone condizioni igieniche è sufficiente procedere ai trattamenti di disinfestazione ogni tre mesi.

Terapia:

il trattamento va effettuato immediatamente ogni volta venga accertata la presenza di parassiti e ripetuto a distanza di 2 – 3 settimane.

AVVERTENZE

In caso di difficoltà di dosaggio, per esempio quando si è impossibilitati a pesare il gatto, si deve arrotondare per eccesso la dose di Nemex[®] da somministrare. Il preparato, infatti, al di sotto del dosaggio indicato non esplica appieno tutta la sua efficacia terapeutica; al contrario, dosi elevate non presentano controindicazioni.

Nemex[®] presenta un ampio margine di sicurezza e può essere tranquillamente somministrato a soggetti di tutte le età, in qualsiasi stato fisiologico (incluso femmine in gravidanza e allattamento) ed in qualsiasi stato e gravità di malattia.

Nemex[®] anche se somministrato in dosi 120 volte superiori a quella terapeutica e per parecchi giorni non presenta sintomi di intolleranza (vomito, perdita di peso).

CONFEZIONI

Siringa da 2 grammi A.I.C. n. 100085048
Siringa da 3 grammi A.I.C. n. 100085051

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

LA VENDITA NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA DEL MEDICO VETERINARIO

Titolare A.I.C.	Preparato da:	Responsabile del rilascio dei lotti nella UE:
Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 – Latina	Pfizer Inc. Lincoln, NE (USA) <i>Oppure:</i> Bayer Health Care, 2809 Shawnee Mission Parkway Shawnee, KS 66216 USA	Pfizer Animal Health S.A. Louvain-la-Neuve - Belgium