

**Formevet**<sup>®</sup>  
ONE HEALTH FOR ALL

**NEO FORTECID<sup>®</sup>**  
**FORMICHE**  
**TRAPPOLE**  
**FORMICHE**

#### Istruzioni d'uso

- Leggere sempre l'etichetta o l'opuscolo prima dell'utilizzo e rispettare tutte le istruzioni indicate.
- Evitare l'utilizzo continuo del prodotto.
- Applicare il prodotto con precisione sulla traccia delle formiche o vicino al nido.
- Rispettare le dosi di applicazione del prodotto.
- La diminuzione della popolazione può essere osservata 7 giorni dopo l'applicazione, ma la completa eradicazione può richiedere fino a un mese.
- Le stazioni esca devono essere controllate 7 giorni dopo la prima applicazione e poi una volta alla settimana.
- Rinnovare l'esca in gel consumata o sporca fino alla completa eradicazione della colonia o un mese dopo l'applicazione se l'infestazione persiste.
- Non mescolare con altri prodotti e non applicare su superfici già trattate con un altro biocida.
- Proteggere sempre il prodotto da piogge, inondazioni e acque di lavaggio.
- Se l'infestazione persiste contattare un professionista.
- Informare il titolare della registrazione se il trattamento è inefficace.
- Non applicare il prodotto su superfici assorbenti.
- Non esporre le gocce dell'esca alla luce del sole o al calore (es. radiatore).
- In caso di reinfestazione, rinnovare l'applicazione.
- Rimuovere l'esca alla fine del periodo di trattamento per il successivo smaltimento.

**Metodi di applicazione:** applicazione della stazione con esca.

#### Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 0,2 g/m<sup>2</sup>.  
Trattamento con la stazione con esca già presente adatta alla zona da trattare rispettando la dose di 0,2 g/m<sup>2</sup>.  
Per esempio, una stazione con esca già presente di 5 g per trattare 25 m<sup>2</sup>.  
Posizionare la stazione con esca lungo il percorso delle formiche o vicino al nido, se possibile.

#### Misure di mitigazione del rischio

- Per uso esterno, applicare questo biocida solo in scatole con esche. Proteggere dalle api coprendo, per esempio con un vaso da fiori o una tegola (assicurandosi che le formiche abbiano ancora accesso all'esca).
- Non applicare direttamente sopra o in prossimità di alimenti, mangimi o bevande, né su superfici o utensili che potrebbero essere in contatto diretto con alimenti, mangimi, bevande e bestiame.
- Evitare l'accesso all'esca da parte di bambini e animali.
- Attenersi rigorosamente alle norme di igiene individuale: non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto e lavarsi le mani dopo l'uso.
- Non applicare mai l'esca in gel per un trattamento preventivo, ma utilizzarla solo in caso di infestazione accertata.
- All'aperto, non applicare sull'orto.
- La presenza di 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, sensibilizzante della pelle che può produrre una reazione allergica.
- Il prodotto contiene dinotefuran pericoloso per le api.

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi  
**Esca in gel (pronta all'uso)**  
Uso non professionale

2 confezioni da 5 g

**Area di utilizzo:** In ambiente chiuso, Interno, Locali industriali, commerciali o pubblici e area privata, All'aperto, Esterno, Esterno intorno a case ed edifici, Esterno su terrazze.

#### NEO FORTECID<sup>®</sup> FORMICHE TRAPPOLE

##### Sostanze attive:

Dinotefuran (CAS 165252-70-0) 0,0202% m/m

**EUH208** Contiene 2-methyl-2H-isothiazolo-3-one. Può provocare una reazione allergica.

**P501** Smaltire il recipiente in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e internazionali.

**Distribuito da:** FORMEVET S.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 Milano (Italia)

Tel. +39 02 4345891

2 confezioni da 5 g

**PRODOTTO BIOCIDA (PT18): autorizzazione del Ministero della Salute n.IT/2023/00835/MRS**

**Nome approvato:** NEO FORTECID FORMICHE TRAPPOLE

**Titolare dell'autorizzazione:** LODI S.A.S.

PA des Quatre Routes,  
35390 Grand-Fougeray (Francia)  
Tel. +33 2 99 08 48 59

##### Composizione:

Dinotefuran (CAS 165252-70-0) 0,0202% m/m;  
Isopentyl acetate 0,005% m/m  
cyclohexane 0,01% m/m  
BIT 0,001% m/m

##### Istruzioni pronto soccorso

- Contatto con la pelle: lavare la pelle contaminata con acqua e sapone. Contattare uno specialista del trattamento dei veleni in caso di sintomi.
- Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con abbondante acqua, sollevando occasionalmente le palpebre superiori e inferiori. Controllare e rimuovere eventuali lenti a contatto se è facile farlo. Continuare a sciacquare con acqua tiepida per almeno 10 minuti. Richiedere l'intervento di un medico se si verificano irritazioni o disturbi della vista.
- Contatto con la bocca: sciacquare la bocca con acqua. Contattare uno specialista nel trattamento dei veleni.
- Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta.

**Organismo target:** Formica nera dei giardini

(*Lasius niger*): tutti gli stadi di sviluppo.  
Formica argentina (*Linepithema humile*): tutti gli stadi di sviluppo. *Monomorium pharaonis* (Pharaon ant): tutti gli stadi di sviluppo (Interno).

##### Smaltimento sicuro

- Non gettare il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nelle tubature (lavandino, toilette...) né nelle fognature.
- Smaltire il prodotto inutilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti, in conformità con le normative locali.

##### Conservazione

- Conservare in un luogo sicuro fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
- Durata di conservazione: 2 anni.
- Conservare il prodotto a temperatura superiore a 0 °C.
- Conservare il prodotto al riparo dalla luce.

**Astuccio:** PAP-21 CARTA

Contiene un BIOCIDA, smaltire le parti contaminate in base alle disposizioni del servizio di raccolta dei rifiuti del proprio territorio. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

UFI: 3328-D2US-900A-TPT3

Validità e lotto n. del: vedi confezione



*Firmavel*<sup>®</sup>  
ONE HEALTH FOR ALL

41123

**NEO FORTECID<sup>®</sup>**  
**FORMICHE**  
**TRAPPOLE**



**F**  
**FORMICHE**

**ESCA IN GEL PRONTA ALL'USO**  
**USO NON PROFESSIONALE**

**Area di utilizzo:** In ambiente chiuso,  
Interno, Locali industriali, commerciali  
o pubblici e area privata, All'aperto,  
Esterno, Esterno intorno a case ed edifici,  
Esterno su terrazze.

**NEO FORTECID® FORMICHE  
TRAPPOLE**

**UFI: 3328-D2US-900A-TPT3**

**Composizione:** Dinotefuran (CAS 165252-70-0)

0,0202% m/m. **EUH208** Contiene 2-methyl-2H-isothiazolo-3-one.

Può provocare una reazione allergica. **P501** Smaltire il recipiente in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e internazionali.

**Dosi di impiego e frequenze** - Tasso di domanda: 0,2 g/m<sup>2</sup>. Trattamento con la stazione con esca già presente; applicare la stazione con esca già presente adatta alla zona da trattare rispettando la dose di 0,2 g/m<sup>2</sup>. Per esempio, una stazione con esca già presente di 5 g per trattare 25 m<sup>2</sup>. Posizionare la stazione con esca lungo il percorso delle formiche o vicino al nido, se possibile.

**Distribuito da:** FORMEVET S.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 Milano (Italia)  
Tel. +39 02 4345891

**Validità e lotto n. del:  
vedi confezione**

**5 g**

**PRODOTTO BIOCIDA (PT18):**

autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2023/00835/MRS

**Titolare dell'autorizzazione:** LODI S.A.S. - PA des Quatre Routes,  
35390 Grand-Fougeray (Francia) - Tel. +33 2 99 08 48 59

**Organismo target:** Formica nera dei giardini (*Lasius niger*);  
tutti gli stadi di sviluppo. Formica argentina (*Linepithema humile*);  
tutti gli stadi di sviluppo. *Monomorium pharaonis* (Pharaon ant);  
tutti gli stadi di sviluppo (Interno). **Prima dell'uso leggere  
le istruzioni accluse, seguire le istruzioni per  
l'uso e le precauzioni d'uso.**

A/1123