350 mm

Single Label – FRONT / BACK Label – (printed on one side)

150 mm

IT SG Granulare solubile in acqua
Non conservare vicino a alimenti, bevande e mangimi.

Istruzioni per l'uso:
Neporex 2SG deve essere applicato versando il prodotto diluito utilizzando un annaffiatoio.
Diluizione (%): Per la preparazione della soluzione di applicazione, diluire 25 g di biocida in 1 litro d'acqua per trattare 1 m^2.
Dose di applicazione: Applicare 25 g di prodotto biocida/m^2 = 0,5 g di principio attivo/m^2; ciò equivale a 1 litro di soluzione di applicazione per m^2.
Numero e frequenza di applicazione:
Stalle per vacche da latte e piccoli ruminanti: massimo (max.) 5 applicazioni all'anno
Stalle per bovini da carne: max. 5 applicazioni all'anno
Allevamento di suini: max. 1 applicazione all'anno
Stalle per polli: max. 1 applicazione all'anno
Stalle per altro pollame (tacchini, anatre, oche): max. 5 applicazioni all'anno
Conigli: max. 5 applicazioni all'anno
Nel caso in cui siano necessarie più applicazioni all'anno per una categoria di animali a causa di infestazioni ripetute, devono essere utilizzati prodotti alternativi con un principio attivo diverso.
Riapplicazione in caso di applicazioni multiple: almeno 6 settimane e fino a diversi mesi tra un'applicazione e l'altra.
Leggere sempre l'etichetta o il foglietto prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni riportate.
Non autorizzato per l'uso in stabulazioni di vitelli a carne bianca.
Diluire i granuli in acqua.(25 g di prodotto biocida in 1 litro di acqua per trattare 1m^2) È consentita solo l'applicazione con annaffiatoio.
La riduzione della popolazione di mosche può essere osservata a partire da 2 settimane dopo l'applicazione del prodotto.

Strutture per bovini e piccoli ruminanti (ad esempio ovini e caprini)
Lettiera: effettuare il trattamento entro i primi giorni (fino a 3 giorni) dall'inizio di un ciclo produttivo o entro i primi 3 giorni dopo la rimozione del letame e l'inizio dell'accumulo di nuovo materiale organico. Si raccomanda il trattamento lungo le pareti, i bordi e le aree di fuoriuscita intorno alle mangiatoie, agli abbeveratoi e dove si accumula il letame. È probabile che i siti di riproduzione delle mosche si trovino dove il letame non viene compattato, in particolare lungo muri o recinzioni, perché lettiere ben calpestate limitano lo sviluppo di larve di mosca.
Pavimento a grigliato: trattare l'intera superficie del pavimento entro i primi giorni (fino a 3 giorni) dopo aver pulito la fossa del letame, ma solo dopo che il nuovo letame inizi ad accumularsi di nuovo.
Nel caso di ruminanti di piccola taglia (es. pecore e capre) tenuti su lettiere morbide, le larve possono essere trovate su tutta la superficie della cuccetta/recinto; pertanto, è necessaria l'applicazione del prodotto su tutta la superficie. Se necessario applicare negli angoli o intorno agli abbeveratoi e alle mangiatoie.

Strutture per suini
Sistema tutto pieno - tutto vuoto: effettuare il trattamento entro i primi giorni (fino a 3 giorni) dopo la pulizia della fossa del letame, ma solo dopo che il nuovo letame inizia ad accumularsi.
Pavimenti a grigliato: trattare l'intera superficie del pavimento entro i primi giorni (fino a 3 giorni) dopo aver pulito la fossa del letame, ma solo dopo che il nuovo letame inizia ad accumularsi.
Lettiera: effettuare il trattamento entro i primi giorni (fino a 3 giorni) dopo la rimozione del letame ma solo dopo che il letame inizia ad accumularsi. Si raccomanda il trattamento lungo le pareti, i bordi e le aree di fuoriuscita intorno alle mangiatoie, agli abbeveratoi e dove si accumula il letame. È probabile che i siti di riproduzione delle mosche si trovino dove il letame non viene compattato, in particolare lungo muri o recinzioni, perché nelle lettiere ben calpestate lo sviluppo di larve di mosca è limitato.

Strutture per pollame (galline ovaiole, polli da carne, riproduttori)
Fosse profonde, grigliati, aree di accumulo/stoccaggio della pollina: effettuare il trattamento su tutta l'area della pollina entro i primi giorni (fino a 3 giorni) dopo la rimozione della pollina, ma solo dopo che la pollina inizia ad accumularsi.
Allevamenti su lettiera: applicare sui punti umidi in cui si sviluppano le larve, come ad esempio nelle aree intorno agli abbeveratoi e alle mangiatoie o nei punti in cui si verifica una perdita d'acqua (caduta di condensa di vapore, perdita da tubature dell'acqua ecc.).
Allevamenti con nastri di rimozione della pollina: rimuovere la pollina di allevamento al di fuori delle strutture ad intervalli sufficienti abbastanza ad evitare lo sviluppo di larve. Può verificarsi la fuoriuscita di pollina sul pavimento o l'accumulo di pollina negli angoli e facilitare lo sviluppo delle larve. Effettuare il trattamento versando la soluzione su questi punti.

Altro pollame (tacchini, anatre, oche)
Allevamenti su lettiera: effettuare il trattamento sui punti umidi in cui si sviluppano le larve, come ad esempio nelle aree intorno agli abbeveratoi e alle mangiatoie o nei punti in cui si verifica una perdita d'acqua (caduta di condensa di vapore, perdita da tubazioni dell'acqua ecc.).
Aree su grigliato: applicare la soluzione su tutta l'area della pollina entro i primi giorni (fino a 3 giorni) dopo la rimozione della pollina, ma solo dopo che la pollina inizia ad accumularsi. Riapplicare ogni volta che il livello di pollina aumenta di 10 cm.

Strutture per conigli
Fosse profonde, aree di accumulo/stoccaggio del letame: applicare la soluzione su tutta l'area del letame entro i primi giorni (fino a 3 giorni) dopo la rimozione del letame, ma solo dopo che il primo letame inizia ad accumularsi. Riapplicare ogni volta che il livello di letame aumenta di 10 cm.
Allevamenti con sistemi di rimozione meccanica: rimuovere il letame al di fuori dell'allevamento ad intervalli sufficienti per evitare lo sviluppo di larve. Possono verificarsi fuoriuscite di letame sul pavimento o accumuli di letame sugli angoli e facilitare lo sviluppo delle larve. Effettuare il trattamento versando la soluzione su questi punti.

ES Granulado soluble en agua
No almacenar cerca de alimentos, bebidas y pienso.

Instrucciones de uso
Neporex 2SG se aplica mediante vertido del producto diluido utilizando una regadera.
Dilución (%): Para la preparación de la solución a aplicar, diluir 25 g del producto biocida en 1 litro de agua para tratar 1 m^2.
Tasa de aplicación: Aplicar 25 g del producto biocida/ m^2 = 0,5 g de sustancia activa/m^2; equivalente a la aplicación de 1 litro de solución por m^2.

20 kg

Elanco™

NEPOREX™ 2 SG

Per il controllo delle mosche domestiche (*Musca domestica*, larve), negli ambienti interni di stabulazione degli animali, da applicare da parte di utilizzatori professionali.
Para el control de moscas (*Musca domestica*, larvas) en el interior de instalaciones ganaderas, para ser aplicado por usuarios profesionales.

Cyromazine/ciromazina 20 g/Kg

Numero di autorizzazione/Nº de autorización:
EU-0032480-0000

Elanco Animal Health Inc.
Mattenstrasse 24A
CH-4058 Basel

Tel:+39 055 4640825
infoitalia@elanco.com

Elanco Italia S.p.A.
Via dei Colatori 12,
50019, Sesto Fiorentino, Italy

Tel:+ 34 919033840
infoelanco.es@meisys.es

Número y frecuencia de aplicación:
Establos de vacuno lechero y pequeños rumiantes: máximo (max.) 5 aplicaciones al año
Establos de bovino: max. 5 aplicaciones al año
Establos de porcino: max. 1 aplicación al año
Explotaciones de pollos: max. 1 aplicación al año
Explotaciones avícolas de otras aves (pavos, patos, ocas): max. 5 aplicaciones al año
Establos cunícolas: max. 5 aplicaciones al año
En caso de que se necesiten más aplicaciones al año para una categoría animal por infestación repetida, deben utilizarse productos alternativos que contengan una sustancia activa diferente.
Reaplicación en caso de múltiples aplicaciones: Al menos 6 semanas y hasta varios meses entre aplicaciones.
Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de usar y siga las recomendaciones de uso.
No autorizado para su uso en casetas de alojamiento individual para terneros.
Diluir los gránulos en agua (25 g del producto biocida en 1 L de agua para tratar 1 m^2). Sólo se permite la aplicación mediante regado.
La reducción de la población de moscas se puede observar a partir de 2 semanas después de la aplicación del producto.

Instalaciones de bovinos y pequeños rumiantes (como ovejas y cabras)
Cama profunda: Realizar el tratamiento en los primeros días (hasta 3 días) después de iniciar un ciclo de cría o en los primeros 3 días después de la eliminación del estiércol y de que haya comenzado la acumulación de nuevo material. Se recomienda el tratamiento de paredes, bordes y áreas de derrame alrededor de comederos, bebederos y donde se acumula estiércol. Es probable que los sitios de reproducción de moscas se encuentren donde el estiércol no esté compactado, particularmente en paredes o cercas, porque en la cama muy pisada se desarrollan pocas larvas de mosca.
Suelo emparrillado: Tratar todo el área del suelo en los primeros días (hasta 3 días) después de limpiar la fosa de estiércol, pero sólo después de que el estiércol nuevo comience a acumularse nuevamente.
En el caso de pequeños rumiantes (por ejemplo, ovejas y cabras) que se mantienen en camas blandas, se pueden encontrar larvas en toda la superficie del cubículo/corral; por lo que se requiere la aplicación del producto en toda la superficie. Aplicar en rincones o alrededor de bebederos y comederos, si necesario.

Instalaciones de porcino
Sistema todo dentro, todo fuera: Realizar el tratamiento en los primeros días (hasta 3 días) después de limpiar la fosa de purín, pero sólo después de que comiencen a acumularse nuevos purines.
Suelos emparrillados: Tratar todo el área del suelo en los primeros días (hasta 3 días) después de limpiar la fosa de purín, pero sólo después de que comiencen a acumularse nuevos purines.
Cama profunda: Llevar a cabo el tratamiento en los primeros días (hasta 3 días) después de la eliminación del purín, pero sólo después de que los purines comiencen a acumularse. Tratar paredes, bordes y áreas de derrame alrededor de comederos, bebederos y donde se acumulan purines. Es probable que los sitios de reproducción de moscas se encuentren donde el purín no esté compactado, particularmente en paredes o cercas, porque en la cama muy pisoteada se desarrollan pocas larvas de mosca.

Instalaciones aviares (ponedoras, engorde, reproductoras)
Operaciones en vacija profunda, suelos emparrillados, suelo-apilamiento de estiércol: Realizar el tratamiento en todo el área de la gallinaza en los primeros días (hasta 3 días) después de la eliminación de la misma, pero sólo después de que la gallinaza comience a acumularse.
Operaciones de camas: Aplicar en los puntos húmedos donde se desarrollan las larvas, como por ejemplo en zonas alrededor de bebederos y comederos o en puntos donde se produzcan fugas de agua (caída de condensación de vapor, fugas de tuberías de agua, etc.).
Operaciones con cintas de eliminación de estiércol: Retirar la gallinaza fuera de las operaciones a intervalos suficientes para evitar el desarrollo de larvas. Pueden producirse derrames de gallinaza en el suelo o acumulación de la misma en los rincones que faciliten el desarrollo de las larvas. Realizar el tratamiento vertiendo la solución de aplicación sobre estos puntos.

Otras aves (pavos, patos, gansos)
Operaciones en las camas: Aplicar la solución de aplicación en los puntos húmedos donde se desarrollan las larvas, como por ejemplo en zonas alrededor de bebederos y comederos o en puntos donde se produzcan fugas de agua (caída de condensación de vapor, fugas de tuberías de agua, etc.).
Áreas emparrilladas: Aplicar la solución de aplicación en todo el área del estiércol en los primeros días (hasta 3 días) después de la eliminación del mismo, pero sólo después de que el estiércol comience a acumularse. Reaplicar cada vez que el nivel de estiércol aumente 10 cm.

Instalaciones cunícolas
Fosas profundas, operaciones de apilamiento de estiércol en el suelo: Aplicar la solución de aplicación en todo el área del estiércol en los primeros días (hasta 3 días) después de la retirada del mismo, pero sólo después de que el primer estiércol comience a acumularse. Reaplicar cada vez que el nivel de estiércol aumente 10 cm.
Operaciones con sistemas de eliminación mecánica: Retirar el estiércol fuera de las operaciones a intervalos suficientes para evitar el desarrollo de larvas.
Pueden producirse derrames de estiércol al suelo o acumulación de estiércol en las esquinas que faciliten el desarrollo de las larvas. Realizar el tratamiento vertiendo la solución de aplicación sobre estos puntos.

YL243044A 921723

Lot:
Expiry Date:

IMPRINT AREA
for 2,3 or 4 ROWS

MUST BE KEPT PRINT FREE
(white) FOR VARIABLE DATA

30mm

40mm

Location Variable Data/Imprint Area: Front Label