

SLURP

SLURP®

Mangime complementare per cavalli in polvere

SLURP è un valido supporto:

- ✓ nella regolarizzazione dell'attività intestinale anche in soggetti convalescenti da interventi chirurgici
- ✓ nell'agevolare le funzioni gastroenteriche dei soggetti anziani e/o con masticazione deteriorata
- ✓ nel rimuovere sabbia o terra dall'intestino e superare la conseguente sindrome da malassorbimento

Composizione: orzo, granturco, semi di lino cotto, farinaccio di frumento, carrube essiccate, erba medica disidratata ad alta temperatura, psyllium polvere.


Additivi per kg: Promotori della digestione (4a1704) Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 5 x 10⁸ CFU.

Componenti analitici: Proteina grezza 12,0%, Fibra grezza 8,28%, Oli e grassi grezzi 8,44%, Ceneri grezze 2,14%, Sodio 0,00%, Umidità 10,8%.

Quantitativo netto: 20 kg

Lotto SCAD

Prodotto ed etichettato da: ACME DRUGS srl
via Portella della Ginestra 9/A - 42025 Cavriago (RE)
Tel: 0522 941919 - N. Ric. Reg. α IT000009 RE
Distribuito da: ACME srl
via Portella della Ginestra 9 - 42025 Cavriago (RE)
N. Ric. Reg. α IT000156 RE



Istruzioni per un uso corretto

Ricostituire il prodotto aggiungendo 250 ml di acqua calda per ogni 100 g di polvere (2,5 l d'acqua per 1 kg di polvere), mescolare fino a completa miscelazione, somministrare immediatamente.

Per contribuire alla normalizzazione della funzione intestinale e alla prevenzione delle coliche sostituire agli alimenti secchi concentrati (mangimi, cereali) un solo giorno alla settimana 1 kg di polvere ogni 150 kg di peso corporeo.

Per favorire il ripristino della funzione intestinale in soggetti convalescenti da interventi chirurgici, dopo il periodo di digiuno, somministrare quale unico alimento 50-100 g di polvere per 100 kg di peso corporeo ogni 6 ore. Non superare la quantità complessiva di 2 kg al dì.

Nei soggetti anziani e/o con masticazione difficoltosa fornire Slurp (1 kg di polvere ogni 150 kg di peso corporeo) almeno 2 giorni alla settimana in sostituzione dei concentrati (mangimi cereali).

Per favorire il ripristino della funzione intestinale in soggetti convalescenti da interventi di chirurgia addominale, dopo il periodo di digiuno, somministrare quale unico alimento 50 g di polvere per 100 kg di peso corporeo ogni 6 ore. Non superare la quantità complessiva di 1 kg al dì.

Nei soggetti esposti all'accumulo di sabbia o terra nell'intestino somministrare una volta al giorno per almeno 7 giorni consecutivi 1 kg di polvere ogni 150 kg di peso corporeo.

www.acmedrugs.com - tech.info@acmedrugs.com

1/SUPM/20/002