

RINKODAROS TEISÉS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO,
JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS: Rinkodaros teisės turėtojas ir už vaisto serijos išleidimą
atsakingas gamintojas: VIRBAC S.A. - 1st avenue 2065 m LID - 06516 Carros - Prancuzija

VEIKLIOJI (IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS:

Vienoje pipetėje yra:	veikliųjų medžiagų		pagalbiniai medžiagai	
Pipetės tūris (vienos dozės)	fipronilo	piriproksifeno	BHA	BHT
0,67 ml	67 mg	20,1 mg	0,134 mg	0,067 mg
1,34 ml	134 mg	40,2 mg	0,268 mg	0,134 mg
2,68 ml	268 mg	80,4 mg	0,536 mg	0,268 mg
4,02 ml	402 mg	120,6 mg	0,804 mg	0,402 mg

Skaidrus, bespalvis arba gelsvas tirpalas.

INDIKACIJA (-OS): Skirtas naudoti užsikrėtus tik blusomis arba blusomis ir erkėmis.

Naudojimas nuo blusų: Šunims, užsikrėtuose blusomis (*Ctenocephalides felis*) gydyti ir nuo užsikrėtimo apsaugoti. Gydymas vaistui 7 savaitės apsaugo nuo užsikrėtimo blusomis. Jis taip pat neleidžia blusoms daugintis 12 savaičiu po užlašinimo, slopindamas kiaušinelių vystymąsi į suaugusias blusas. Vaistas gali būti naudojamas kaip gydymo strategijos dalis blusų sukeltam alerginiu dermatitui (BAD) kontroliuoti, kai liga jau anksčiau buvo diagnozuota veterinarės gydytojės.

Naudojimas nuo erkių: Šunims, užsikrėtuose blusomis (*Ixodes ricinus*), gydyti. Vieną kartą naudotas veterinarinis vaistas pasižymi 2 savaitės išliekančiu akaricidiniu poveikiu *Ixodes ricinus* ir 4 savaitės – *Dermacentor reticulatus* ir *Rhipicephalus sanguineus*. Jeigu gydymo metu šuo jau užsikrėtes tam tikros rūšies erkėmis (*Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*), per pirmasias 48 valandas jos gali žuti ne visos.

KONTRAINDIKACIJOS:

Negalima naudoti triūšiams, nes tai gali sukelti nepalankias reakcijas arba net gyvūno mirtį.

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veiklojeiems medžiagoms arba bet kuriai iš pagalbiniai medžiagų.

NEPALANKIOS REAKCIJOS: Veterinarinio vaisto užlašinimo vietoje galiai pasireikštī trumpalaikis kosmetinis poveiki, pavyzdių, sudrėkis kailis arba nežymus pleiskanomis. Turimais užlašinamymis veterinarinį vaistą, kuriuose yra šiuo veikliu medžiagų, naudojimo patirties duomenimis, užlašinimo vietoje galiai pasireikštī trumpalaikis odos reakcijos (pleiskanomis, viettinis plaukų slinkimas, nežulys, paraudimas, pakitus odos spalva) ir bendras nežulys arba plaukų slinkimas. Labai retai galai pasireikštī padidėjęs seiletekis ir grįžtamieji neurologiniai simptomai (hiperestezija, depresija, nervingumo požymiai), kvėpavimo sutrikimai arba vėmimai. Pastebėjus bet kokių sunčių poveikį ar kitą šiam informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarės gydytojės.

PASKIRTIES GYVŪNU RŪŠYS: Šunys.


DOZĖS, NAUDOMIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVENAI RŪŠIAI:

Dozavimas:


Šuns svoris	Pipetės tūris (vienos dozės)	Fipronilas (mg)	Piriproksifenas (mg)
2–10 kg	0,67 ml	67	20
10–20 kg	1,34 ml	134	40
20–40 kg	2,68 ml	268	80
40–60 kg	4,02 ml	402	120

Daugiau nei 60 kg sveriantiems šunims reikia naudoti tinkamą pipetių derinį.

Naudojimo būdas: Iš lizduotės išimiti vieną pipetę. Laikyti pipetę vertikaliai. Pastuksenti per siaurają pipetės dalį ir išsiskinti, kad slyktis yra pagrindinėje pipetės dalyje. Per išrekitą liniją nulaužti pipetės viršūne. Praskirti šunu kailių ant sprando prieš mentes, kad matytųsi oda. Pipetės galūkų prilaistus tiesiai prie odos ir keletą kartų švelniai spustelėjus išspausčti visą pipetės turinį. Prieikus pipetės turinį galima užlašinti vienoje ar dviejose papildomose vietose išilgai šuns nugaros, kad veterinarinis vaistas nenutekėt arba nebūtų užlašinamas ant kailio, ypač gydant didelius šunis.



Lašėjimo stabdymo sistema (veterinarinis vaistas laša tik suspaudžiant pipetę).



NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOMIMO: Viena pipetė yra viena gydomoji dozė. Gydymą galima kartoti kartą per mėnesį. Siekiant užtikrinti optimalią blusų ar (arba) erkų kontrolę, gydymą galima planuoti atsižvelgiant į vietos epidemiologinę situaciją.

ISLAUKA: Netaikytina.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI: Saugoti nuo vaikų. Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ir etiketės po „EXP“. Tinkamumo data sutampa su paskutiniu nurodymo mėnesio diena. Negalima laikyti aukštėsniuje kaip 30°C temperatūroje.

Laikyti sausoje vietoje. Lizduotę laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

SPECIALIEJI NURODYMAI: Specialieji nurodymai, naudojant atskiru rūšiu paskirties gyvūnams: Tuojau pat po gydymo išprausias gyvūnų šampūnu arba sušlapinu vandeniu, vaisto veiksmingumas gali sutrumpėti. Po gydymo šunjų kartą mėnesį prausiant šampūnu, vaisto poveikiu blusoms trunka 5 savaitės. Jeigu šunjų reikia išprasti šampūnu, geriau tai padaryti prieš gydymą. Po gydymo du kartus gyvūnui nuo kurtuvės išsivystymui iš kiaušinelių nesumažėjo. Šuns sušlapimo arba prausimo šampūnu poveikiu vaisto veiksmingumui nuo erkų neverintas. Pradėjus taikyti kontrolės priemones, invazijos atveju reikia reguliariai apdoroti tinkamų insekticidu ir siurbti dulkų siurbliu gyvūnų krepšius, guolius ir jprastas poliūs vietas; pavyzdių, kilius ir minirkštus baldus. Siekiant sumažinti blusų skaičių aplinkoje, vieni namuose laikyti gyvūnai turėti būti gydomi tinkamais priesmėliais nuo blusų. Vaistas neapsaugo gyvūnų nuo erkų išsiurbimo. Nepalankomių sąlygomis negalima visiškai atmeti užšrečiamujų ligų pernėmimo pavojus. Išrodyta, kad vaisto poveikis *Ixodes ricinus* prasidėja tuoju pat, todėl šios rūšies erkės turėtų žuti per 48 valandas nuo gydymo pradžios. Jeigu gydymo metu gyvūnas jau užsikrėtes *Dermacentor reticulatus* arba *Rhipicephalus sanguineus*, per pirmasias 48 valandas jos žuti ne visos. Dažnai negyvus erkės nuo gyvūno nukris, o likusias reikia atsargiai pažaliinti, kad odoje nelikytų erkų burnos dalių. Specialios atsargumo priesmės asmenimis, naudojantim vaistą gyvūnams: Šis veterinarinis vaistas sukelia sukriti neurotoksinų poveiki. Nurytas šis veterinarinis vaistas gali pakenkti sveikatai. Vengti patekimo ant odos ir į burną. Reikia saugotis, kad veterinarinis vaistas nebūtų prarytas, taip pat ir liečiant burną ranka, ant kurios yra patekė vaisto. Naudojant veterinarinį vaistą, negalima rūkyti, geriti ar valgyti. Po naudojimo reikia nusiplatinti rankas. Negalima glodioti gydomu gyvūnu ir leisti vaikams žauti su gydomais gyvūnais, kol neįšaudžiusta vaisto užlašinimo vieta. Dėl šios priežasties rekomenduojama gyvūnus gydyti ne dieną, bet ankti valare, o tuo po gydymo gyvūnamis nereikėtų leisti megti vienoje lovoje su šeimininkais, ypač su vaikais. Pipetes iki pat naudojimo reikia laikyti originalioje pakuočėje, o panaudotas pipetes – nedelsiant tinkamai sunaikinti. Atsitiktinai patekus ant odos, reikia nuplauti vandeniu. Atsitiktinai prarytus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinių lapelio arba etiketės. Tik veterinariniams naudojimui. Kitos atsargumo priesmės: Fipronilas ir piriproksifenos gali neigiamai veikti vandens organizmuis. 48 valandas po gydymo šunims negalima leisti bristi į upelius ir upes. Veterinarinis vaistas galai pažeisti dazytų, laukot ar kitus būtybės naudojamų dalkas paviršius arba baldus. Prieš leidžiant šuniui liestus prie tokio dalkytui reikia išskinti, kad užlašinimo vieta būtų višiskai iššūviusi.

Vaikinguumas ir laktacija: Laboratoriniuose tyrimuose fipronilo ir piriproksifeno teratogeninis arba embriotoksinis poveikis nenustatytas. Šis veterinarinis vaisto saugumas kalėmos vaikinguumo ir laktacijos metu neturitas. Veterinarinių vaistų vaikinguumo ir laktacijos metu naudoti atskirai tik atskirai. Negalima glodioti gydomu gyvūnu ir leisti vaikams žauti su gydomais gyvūnais, kol neįšaudžiusta vaisto užlašinimo vieta. Dėl šios priežasties rekomenduojama gyvūnus gydyti ne dieną, bet ankti valare, o tuo po gydymo gyvūnamis nereikėtų leisti megti vienoje lovoje su šeimininkais, ypač su vaikais. Pipetes iki pat naudojimo reikia laikyti originalioje pakuočėje, o panaudotas pipetes – nedelsiant tinkamai sunaikinti. Atsitiktinai patekus ant odos, reikia nuplauti vandeniu. Atsitiktinai prarytus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinių lapelio arba etiketės. Tik veterinariniams naudojimui. Kitos atsargumo priesmės: Fipronilas ir piriproksifenos gali neigiamai veikti vandens organizmuis. 48 valandas po gydymo šunims negalima leisti bristi į upelius ir upes. Veterinarinis vaistas galai pažeisti dazytų, laukot ar kitus būtybės naudojamų dalkas paviršius arba baldus. Prieš leidžiant šuniui liestus prie tokio dalkytui reikia išskinti, kad užlašinimo vieta būtų višiskai iššūviusi. Vengti patekimo ant odos ir į burną. Reikia saugotis, kad veterinarinis vaistas nebūtų prarytas, taip pat ir liečiant burną ranka, ant kurios yra patekė vaisto. Naudojant veterinarinį vaistą, negalima rūkyti, geriti ar valgyti. Po naudojimo reikia nusiplatinti rankas. Negalima glodioti gydomu gyvūnu ir leisti vaikams žauti su gydomais gyvūnais, kol neįšaudžiusta vaisto užlašinimo vieta. Dėl šios priežasties rekomenduojama gyvūnus gydyti ne dieną, bet ankti valare, o tuo po gydymo gyvūnamis nereikėtų leisti megti vienoje lovoje su šeimininkais, ypač su vaikais. Pipetes iki pat naudojimo reikia laikyti originalioje pakuočėje, o panaudotas pipetes – nedelsiant tinkamai sunaikinti. Atsitiktinai patekus ant odos, reikia nuplauti vandeniu. Atsitiktinai prarytus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinių lapelio arba etiketės. Tik ipaši noradžiųjų laikyti gyvūnams. Šis veterinarinis vaistas sukelia sukriti neurotoksinų poveiki. Nurytas šis veterinarinis vaistas gali pakenkti sveikatai. Vengti patekimo ant odos ir į burną. Reikia saugotis, kad veterinarinis vaistas nebūtų prarytas, taip pat ir liečiant burną ranka, ant kurios yra patekė vaisto. Naudojant veterinarinį vaistą, negalima rūkyti, geriti ar valgyti. Po naudojimo reikia nusiplatinti rankas. Negalima glodioti gydomu gyvūnu ir leisti vaikams žauti su gydomais gyvūnais, kol neįšaudžiusta vaisto užlašinimo vieta. Dėl šios priežasties rekomenduojama gyvūnus gydyti ne dieną, bet ankti valare, o tuo po gydymo gyvūnamis nereikėtų leisti megti vienoje lovoje su šeimininkais, ypač su vaikais. Pipetes iki pat naudojimo reikia laikyti originalioje pakuočėje, o panaudotas pipetes – nedelsiant tinkamai sunaikinti. Atsitiktinai patekus ant odos, reikia nuplauti vandeniu. Atsitiktinai prarytus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinių lapelio arba etiketės. Tik ipaši noradžiųjų laikyti gyvūnams. Šis veterinarinis vaistas sukelia sukriti neurotoksinų poveiki. Nurytas šis veterinarinis vaistas gali pakenkti sveikatai. Vengti patekimo ant odos ir į burną. Reikia saugotis, kad veterinarinis vaistas nebūtų prarytas, taip pat ir liečiant burną ranka, ant kurios yra patekė vaisto. Naudojant veterinarinį vaistą, negalima rūkyti, geriti ar valgyti. Po naudojimo reikia nusiplatinti rankas. Negalima glodioti gydomu gyvūnu ir leisti vaikams žauti su gydomais gyvūnais, kol neįšaudžiusta vaisto užlašinimo vieta. Dėl šios priežasties rekomenduojama gyvūnus gydyti ne dieną, bet ankti valare, o tuo po gydymo gyvūnamis nereikėtų leisti megti vienoje lovoje su šeimininkais, ypač su vaikais. Pipetes iki pat naudojimo reikia laikyti originalioje pakuočėje, o panaudotas pipetes – nedelsiant tinkamai sunaikinti. Atsitiktinai patekus ant odos, reikia nuplauti vandeniu. Atsitiktinai prarytus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinių lapelio arba etiketės. Tik ipaši noradžiųjų laikyti gyvūnams. Šis veterinarinis vaistas sukelia sukriti neurotoksinų poveiki. Nurytas šis veterinarinis vaistas gali pakenkti sveikatai. Vengti patekimo ant odos ir į burną. Reikia saugotis, kad veterinarinis vaistas nebūtų prarytas, taip pat ir liečiant burną ranka, ant kurios yra patekė vaisto. Naudojant veterinarinį vaistą, negalima rūkyti, geriti ar valgyti. Po naudojimo reikia nusiplatinti rankas. Negalima glodioti gydomu gyvūnu ir leisti vaikams žauti su gydomais gyvūnais, kol neįšaudžiusta vaisto užlašinimo vieta. Dėl šios priežasties rekomenduojama gyvūnus gydyti ne dieną, bet ankti valare, o tuo po gydymo gyvūnamis nereikėtų leisti megti vienoje lovoje su šeimininkais, ypač su vaikais. Pipetes iki pat naudojimo reikia laikyti originalioje pakuočėje, o panaudotas pipetes – nedelsiant tinkamai sunaikinti. Atsitiktinai patekus ant odos, reikia nuplauti vandeniu. Atsitiktinai prarytus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinių lapelio arba etiketės. Tik ipaši noradžiųjų laikyti gyvūnams. Šis veterinarinis vaistas sukelia sukriti neurotoksinų poveiki. Nurytas šis veterinarinis vaistas gali pakenkti sveikatai. Vengti patekimo ant odos ir į burną. Reikia saugotis, kad veterinarinis vaistas nebūtų prarytas, taip pat ir liečiant burną ranka, ant kurios yra patekė vaisto. Naudojant veterinarinį vaistą, negalima rūkyti, geriti ar valgyti. Po naudojimo reikia nusiplatinti rankas. Negalima glodioti gydomu gyvūnu ir leisti vaikams žauti su gydomais gyvūnais, kol neįšaudžiusta vaisto užlašinimo vieta. Dėl šios priežasties rekomenduojama gyvūnus gydyti ne dieną, bet ankti valare, o tuo po gydymo gyvūnamis nereikėtų leisti megti vienoje lovoje su šeimininkais, ypač su vaikais. Pipetes iki pat naudojimo reikia laikyti originalioje pakuočėje, o panaudotas pipetes – nedels



STUDIO GRAPHIQUE CREA	PAYS : EE-IT-LT-LV (VBI) CODE PRODUIT FINI : 307480/307481/307482/307483 CODE ÉLÉMENT : 83913801 ÉLÉMENT : NOTICE LOGICIEL UTILISÉ : INDESIGN CC	CODE FAMILLE : 3B8 DIMENSIONS A PLAT : 105MM X 670MM DIMENSIONS PLIEE : 105MM X 38MM MATERIAU(X) / GRAMMAGE(S) : OFFSET AFNOR : VII - 65G CARACTERISTIQUE DE L'UNITÉ DE RECEPTION : UNITAIRE	NOIR
NOM DE PRODUIT : EFFIPRO DUO CHIENS	CORPS DE TEXTE : 6,2 PTS		
	COMMENTAIRE(S) :		
ESSAI FICHIER, FAIT PAR : xx VERSION LE : v1 - xx/xx/2016	MATRICE FICHIER, FAIT PAR : xx VERSION LE : v1 - xx/xx/2016	MAQUETTE - LANCEMENT FICHIER, FAIT PAR : CA CORRIGÉ PAR : MU MU CP	MAQUETTE - MODIFICATION VERSION LE : v1 - 08/06/2016 VERSION LE : v2 - 16/06/2016 v3 - 14/10/2016 v4 - 24/01/2017
			PRODUCTION FICHIER, FAIT PAR : VV VALIDATION PAR : A.Salgarolo LE : 07/02/2017 LE : 24/01/2017