

## FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Prazitel Gatto 230/20 mg Compresse Rivestite appetibili per Gatti

**1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI ZIONE RESPONSABILE DELLA DISTRIBUZIONE DEL LOTTO, SE DIVERSI**

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in commercio e responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irlanda

Rappresentante locale:

Ecuphar Italia S.R.L.

Viale Francesco Restelli, 3/7, piano 1

20124 Milano (Italia)

**2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

Prazitel Gatto 230/20 mg Compresse Rivestite appetibili per Gatti

Pirantel, Praziquantel.

**3. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

Ogni compressa rivestita contiene 230 mg di pirantel embonato e 20 mg di praziquantel.

Compressa rivestita, tonda e biconvessa, da bianca a biancastra con una linea di incisione su un lato, piatta sull'altro lato.

**4. INDICAZIONI**

Per il trattamento delle infestazioni miste causate dai seguenti nematodi e cestodi gastrointestinali:

Nematodi: *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*,

Cestodi: *Dipylidium caninum*, *Taenia taeniaeformis*, *Echinococcus multilocularis*

## 5. CONTROINDICAZIONI

Non usare simultaneamente a composti contenenti piperazina.

Non trattare gattini di meno di 6 settimane.

Non usare in animali con ipersensibilità nota ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

## 6. REAZIONI AVVERSE

Nessuna conosciuta

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario.

## 7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatti

## 8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

*Dosaggio*

Il tasso di dosaggio consigliato è il seguente: 20 mg di pirantel (57,5 mg/kg di pirantel embonato) e 5 mg/kg di praziquantel. Ciò equivale a 1 compressa per 4 kg di peso corporeo.

Peso Corporeo	Comprese
1,0-2,0 kg	½
2,1-4,0 kg	1
4,1-6,0 kg	1 ½
6,1-8,0 kg	2

*Somministrazione e durata del trattamento*

Somministrazione di una singola dose orale. La compressa deve essere somministrata direttamente al gatto, ma se necessario può essere nascosta negli alimenti.

Nelle infestazioni da ascaridi, soprattutto nei gattini, è possibile che l'eliminazione non sia completa, per questo può persistere il rischio d'infezione per l'uomo.

Pertanto, si dovrebbe ripetere il trattamento con un prodotto idoneo contro i nematodi a intervalli di 14 giorni fino a 2-3 settimane dopo lo svezzamento.

## 9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Per garantire la somministrazione al dosaggio corretto, il peso corporeo deve essere determinato nella maniera più precisa possibile.

## **10. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

## **11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usare dopo la data di scadenza indicata sul blister e sulla scatola.

Scartare le compresse a metà non utilizzate.

Tenere i blister nella scatola esterna

## **12. AVVERTENZE SPECIALI**

### **Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

Non usare durante la gravidanza. È possibile somministrarlo durante l'allattamento.

Dopo la somministrazione di dosaggi superiori a 5 volte la dose consigliata, sono stati osservati segni di intolleranza, come vomito.

La resistenza del parassita ad una certa classe di antelmintici si può verificare dopo uso frequente e ripetuto di un antelmintico appartenente a questa classe.

Le pulci fungono da ospiti intermedi per un tipo di tenia comune: *Dipylidium caninum*.

L'infestazione da tenie si ripete a meno che non si mantengano sotto controllo gli ospiti intermedi quali pulci, topi, ecc.

### **Precauzioni speciali per la persona che somministra il prodotto medicinale veterinario agli animali**

Nel caso di un'ingestione accidentale, richiedere la consulenza di un medico e mostrare il foglietto illustrativo al medico.

Per una buona igiene, le persone che somministrano le compresse direttamente al gatto o che le aggiungono agli alimenti del gatto, devono lavarsi le mani dopo l'uso.

Solo per uso veterinario.

## **13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

Chiedere al tuo medico veterinario/farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

## **14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

## **15. ALTRE INFORMAZIONI**

Confezioni:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 150, 152, 160, 168, 176, 180, 184, 192, 200, 204, 206, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 250, 280, 300, 500 o 1000 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.