

ELETTROLITICA REIDRATANTE III ACME
soluzione per infusione per cavalli, bovini, cani e gatti
1xSacca in PVC free da 2000 ml



COMPOSIZIONE: Ogni ml contiene:

Sostanze attive: Sodio Cloruro 5,0 mg; Potassio Cloruro 0,75 mg; Calcio Cloruro (come Calcio Cloruro Diidrato) 0,35 mg; Magnesio Cloruro (come Magnesio Cloruro Esaidrato) 0,31 mg; Sodio Acetato (come Sodio Acetato Triidrato) 6,4 mg; Sodio Citrato (come Sodio Citrato Diidrato) 0,75 mg.

Concentrazione elettrolitica: Sodio (Na⁺) 140 mEq/l; Potassio (K⁺) 10 mEq/l; Calcio (Ca²⁺) 5 mEq/l; Magnesio (Mg²⁺) 3 mEq/l; Cloro (Cl⁻) 103 mEq/l; Acetato (come HCO₃⁻) 47 mEq/l; Citrato 8 mEq/l. Osmolarità teorica: 307 mOsm/l - pH: 5,0 - 7,0. Soluzione limpida e incolore, sterile, apirogena e isotonica con il sangue.

SPECIE DI DESTINAZIONE: Cavallo, bovino, cane e gatto.

INDICAZIONI PER L'USO: Reidratazione elettrolitica per fluidoterapia.

CONTROINDICAZIONI: Usare con cautela in caso di scompenso cardiaco congestizio, insufficienza renale grave e in stati clinici associati ad edemi e ritenzione idrosalina. Non usare in caso di insufficienza surrenalica, ipoparatiroidismo, diabete insipido, grave ipercalcemia ipovolemia e ipotensione, iperpotassiemia o in casi di ritenzione di potassio, nell' alcalosi metabolica e respiratoria e nella grave insufficienza epatica (incapacità a metabolizzare lo ione acetato).

AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali: La soluzione non fornisce calcio e magnesio in quantità sufficiente per correggere deficit specifici di questi due elementi. Non usare dosi eccessive. Non usare se la soluzione non è perfettamente limpida e priva di particelle visibili. Non usare se il contenitore non è integro. Il bilancio dei fluidi e i livelli degli elettroliti sierici devono essere monitorati con attenzione durante il trattamento.

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione: La soluzione può essere usata per il trattamento di dialisi peritoneale. In caso di recente intervento chirurgico non usare per la dialisi peritoneale. Prima di somministrare la soluzione, che contiene potassio, accertarsi che vi sia un'adeguata funzionalità renale. Somministrare ad una velocità di infusione massima di potassio di 0,5 meq/kg p.c./ora. Si raccomanda una sola ininterrotta somministrazione infusoria e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali: Si raccomanda durante la manipolazione del medicinale veterinario di seguire tutte le appropriate precauzioni igieniche di asepsi. Evitare la contaminazione della soluzione. Le persone con nota ipersensibilità alle sostanze attive elencate nella composizione devono somministrare il medicinale veterinario con cautela. In caso di auto-iniezione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Gravidanza e allattamento: Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del medico veterinario responsabile.

Interazione con altri medicinali veterinari e altre forme di interazione: Dati non disponibili.

Sovradosaggio: La somministrazione di un volume eccessivo può causare edema polmonare qualora la velocità di infusione superi il volume che può venire escreto per via renale. Si raccomanda, in questo caso, l'uso di un diuretico osmotico (es. mannitolo) per indurre la diuresi senza riduzione del riassorbimento di sodio (Na).

Restrizioni speciali per l'uso e condizioni speciali per l'impiego: Non pertinente.

Incompatibilità principali: Nel caso in cui il medicinale veterinario sia utilizzato come diluente di altri medicinali veterinari, attentamente la compatibilità secondo il riassunto delle caratteristiche dei prodotti da miscelare. Usare tecniche asettiche.

EVENTI AVVERSI: Cavallo, bovino, cane e gatto:

Frequenza indeterminata (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)	Edema ¹
---	--------------------

¹ per uso endovenoso in animali con ritenzione salina

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati alla fine di questo foglietto o tramite il sistema nazionale di segnalazione: <https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria>

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE: Uso endovenoso, intradermico, intraperitoneale. Posologia: Cavalli e bovini: 2000 – 30000 ml al giorno. Puledri e vitelli: 2000 – 15000 ml al giorno. Cani: 150 – 3000 ml al giorno. Gatti: 10 – 300 ml al giorno.

RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE: Non usare se la soluzione non è perfettamente limpida e priva di particelle visibili. Non usare se il contenitore non è integro.

TEMPI DI ATTESA: Bovino, cavallo: zero giorni.

PRECAUZIONI SPECIALI PER LA CONSERVAZIONE: Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 25 °C. Non congelare. Dopo la perforazione usare immediatamente.

PRECAUZIONI SPECIALI PER LO SMALTIMENTO: I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente. Chiedere al proprio medico veterinario o al proprio farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

Data dell'ultima revisione dell'etichetta: 05/2026. Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella Banca dati dei medicinali dell'Unione (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it>).

Recapiti

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e recapiti per le segnalazioni di sospetti eventi avversi:

ACME srl via Libero Grassi 9, IT-42025 Cavriago (RE) Tel. +39 0522941919

e-mail: farmacovigilanza.acme@acmeanimalcare.com

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: S.A.L.F. S.p.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO, Cenate Sotto (BG)

Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione. SOLO PER USO VETERINARIO
A.I.C. n. 100330063 GTIN 08008448001667

JSael2ACMF
NO-6971A1 r2 Sam