

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

READING LONG ACTION 2.10 g Collare antiparassitario per gatti

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Un collare da 14g (35 cm) contiene:

principio attivo
diazinone 2.10 g

Eccipienti

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA

Collare medicato antiparassitario marrone

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Gatti

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides felis*) nel gatto per un periodo di 8 mesi.

4.3 Controindicazioni

Non usare su animali malati o convalescenti o su animali con estese lesioni della pelle.

Non usare su gattini di meno di 3 mesi di età.

Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Dopo l'applicazione, se dovessero comparire eventuali segni di sonnolenza, svogliatezza o difficoltà respiratorie, rimuovere immediatamente il collare.

Vedere anche sezione 4.3 (controindicazioni) e sezione 4.10 (sovradosaggio)

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Solo per uso esterno

Non lasciare che gli animali mastichino il collare.

Non utilizzare altri medicinali ad azione antiparassitaria durante la permanenza del collare o entro 7 giorni dalla rimozione.

Rimuovere le pulci dai gattini giovani e dalle madri con un attento uso di un pettine per pulci.

Non usare in concomitanza con gli agenti neurolettici del gruppo fenotiazine.

Non usare su animali affetti da insufficienza cardiaca, spasmi bronchiali, malattie epatiche o renali.

Fissare il collare intorno al collo degli animali, regolando la lunghezza fino ad ottenere una posizione confortevole.

Se applicato su un animale in crescita, adattare il collare alla crescita del collo dell'animale, ed eliminare immediatamente tutti i residui e /o i ritagli del collare.

Nell'animale adulto, l'applicazione corretta consente di inserire due dita tra il collare e il collo.

Tagliare e smaltire la lunghezza in eccesso.

L'adattamento del collare (intorno al collo) deve essere regolarmente verificato.

Durante i primi giorni di utilizzo, si consiglia di controllare il collo dell'animale. È necessario un controllo continuativo dell'integrità del collare durante tutto il periodo di permanenza e contatto con l'animale. Vedi sez. 4.9 (posologia).

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Non permettere ai bambini di giocare con il collare.

Non permettere ai bambini di succhiare o masticare il collare, poiché questo può essere pericoloso.

Non consentire che animali, che indossano il collare, dormano nello stesso letto del proprietario, soprattutto se bambini.

Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il collare.

Il diazinone è un composto organofosforico, pertanto non toccare il collare se si è stati avvisati dal medico di non maneggiare sostanze anticolinesterasiche.

In caso di malessere a seguito di manipolazione del collare, consultare il medico.

Non rimuovere il collare dalla confezione fino al momento dell'uso.

Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Non contaminare gli alimenti, le bevande o i recipienti destinati a contenerle.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non ingerire.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Una leggera irritazione e una leggera e transitoria reazione (perdita di pelo localizzata, eritema, prurito, croste) possono comparire sul collo dell'animale nel punto d'applicazione, in tali casi, si raccomanda una temporanea rimozione del collare fino alla scomparsa dei sintomi.

-In rarissimi casi, tremori, atassia, così come letargia, anoressia e ipersalivazione possono essere osservati.

La frequenza delle possibili reazioni avverse viene definita utilizzando la seguente convenzione:

molto comune (interessa più di 1 animale su 10)

comune (interessa da 1 a 10 animali su 100)

non comune (interessa da 1 a 10 animali su 1.000)

raro (interessa da 1 a 10 animali su 10.000)

molto raro (interessa meno di 1 animale su 10.000)

non noto (non è possibile stimare la frequenza in base ai dati disponibili).

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento

Non usare su gatte in gravidanza od allattamento.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non utilizzare, contemporaneamente e nei 7 giorni successivi alla rimozione, altri antiparassitari (organofosforici o carbammati o neurolettici del gruppo di fenotiazine).

4.9 Posologia e via di somministrazione

Uso esterno

Deve essere applicato intorno al collo un collare per animale. Togliere il collare dal sacchetto e regolarlo attorno al collo dell'animale avendo cura di lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il collo dell'animale ed il collare.

Tagliare la parte in eccedenza.

Il collare non teme l'umidità e le sue proprietà non vengono alterate anche se bagnato.

La sua attività si protrae per un periodo di 8 mesi.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Non superare le dosi consigliate.

I sintomi di intossicazione sono: dispnea, salivazione, rigidità delle articolazioni.

In caso di ingestione accidentale, può verificarsi sovradosaggio e possono comparire sintomi quali ipersalivazione, vomito e diarrea. Chiedi immediatamente consiglio ad un medico veterinario.

In caso di intossicazione grave, iniettare del solfato di atropina alla dose di 0.2 mg/kg.

4.11 Tempo di attesa

Non pertinente

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico – Antiparassitari – Composti organofosforici
Codice ATCvet: QP53AF03.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Il Diazinone è una molecola ad azione insetticida attiva contro la pulce comune (*Ctenocephalides felis*) e diverse specie di zecche (*Rhipicephalus spp.*; *Dermatocentor spp.*).

La sua azione si esplica principalmente con l'inibizione, negli insetti, dell'enzima colinesterasi. L'inibizione è raggiunta quando il Diazinone, in competizione con il neurotrasmettitore acetilcolina, si lega al sito esterasico della colinesterasi. L'acetilcolina viene degradata e si accumula provocando disturbi nervosi.

Poichè il metabolismo del diazinone negli insetti è molto lento, si ottiene in questo modo un avvelenamento di tipo irreversibile.

Il Diazinone presenta un'attività elevata e prolungata contro la pulce (*Ctenocephalides felis*).

5.2 Informazioni farmacocinetiche

La degradazione del Diazinone si effettua, nei mammiferi, nei microsomi delle cellule epatiche; il citocromo P450 è implicato in questa reazione.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Eccipienti:

Carbonato di calcio
Stearato di calcio
Olio di soia epossidato
Disobutil adipato
Complesso Calcio-Zinco LN193^R
Cloruro di Polivinile

Coloranti:

Sicovit brown 75: Collare marrone

6.2 Incompatibilità

Nessuna nota

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni
Dopo l'apertura usare immediatamente

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare nella confezione originale a temperatura inferiore a 25°C.

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Sacchetto bianco opaco termo-sigillato, costituito da quattro strati:
carta, polietilene, alluminio, polietilene, confezionato in una scatola di cartone.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo.

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

Estremamente pericoloso per i pesci e la vita acquatica. Non contaminare stagni, canali o fossati con il collare o imballaggi vuoti.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

VIRBAC - 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 CARROS FRANCE
+ 33 (0)4 92 08 73 04
+ 33 (0)4 92 08 73 48

8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Scatola contenente un collare 14g (35 cm) A.I.C 105236018

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO

Non pertinente

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico-veterinaria.