

Karidiet Pro

Mangime complementare dietetico



**STABILIZZATORE
DEL BILANCIO IDRICO
ED ELETTROLITICO
PER FAVORIRE LA
DIGESTIONE FISIOLÓGICA**



KARIZOO

Karidiet Pro

Mangime complementare dietetico*



Prevenzione e trattamento dei disturbi digestivi (diarrea) e nella convalescenza.

- Somministrare 3 pasti ad intervalli di 12 ore.
- Somministrare dopo i primi segni di diarrea, fino a quando i sintomi non sono scomparsi.
- Il tempo tra la preparazione e la somministrazione deve essere **immediato** (preparare di fronte all'animale da trattare), prima che la **soluzione gelifichi**.
- Si raccomanda di somministrare i primi due pasti con acqua ed il terzo con sostituti del latte.
- L'animale deve avere sempre a disposizione acqua pulita.

Composición

Destrosio, *Plantago ovata*, Pareti cellulari di lievito inattivato (*Saccharomyces cerevisiae*), Bicarbonato di sodio (7%), Citrato di potassio (5%), Cloruro di sodio, Lattosio. Fonti di carboidrati: Destrosio e lattosio.

Complemento nutrizionale che contiene elettroliti, carboidrati e *Plantago ovata* per la prevenzione ed il trattamento dei disturbi digestivi (diarrea), e può essere usato con acqua e/o latte (sostituto del latte) durante la convalescenza.

Le mucillagini dello Psillo (estratto dai semi di *Plantago ovata*) agiscono come regolatori della peristalsi intestinale. In caso di diarrea, possono assorbire l'acqua in eccesso dal lume intestinale per il suo elevato potere igroscopico (aumenta di 30-40 volte il volume a secco in un ambiente alcalino), aumentando la consistenza delle feci e riducendo la perdita di liquidi e sali minerali.

Regola il transito intestinale e garantisce una dieta reidratante ed energetica per brevi periodi (da 36 a 48 ore).

Bicarbonato e citrato sono potenti agenti alcalinizzanti per il contrasto della acidosi metabolica del soggetto diarroico. Il destrosio garantisce il trasporto attivo del sodio presente, garantendo una rapida reidratazione, e fornendo energia di pronto utilizzo.

È efficace contro la diarrea dei vitelli di età inferiore ad 1 settimana, causata da batteri come *E. coli* o virus ed anche contro la diarrea dei vitelli di età tra 1 e 3 settimane causata da virus e criptosporidi.

Nelle intossicazioni alimentari agisce come depuratore intestinale trascinando le tossine con il bolo fecale.

Specie di destinazione

Vitelli, agnelli, capretti e puledri.

In animali con abomaso la somministrazione simultanea di latte andrebbe evitata. La presenza di caseina ritarda lo svuotamento abomasale.

Istruzioni per l'uso

Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.

Non usare insieme a farmaci antispasmo, o altre soluzioni elettrolitiche, salvo INDICAZIONE veterinaria diversa.

Via di somministrazione

Via orale, sciolto in acqua e/o latte (sostituto del latte) calda/o a 40°C.

Dosi

Somministrare 3 dosi con un intervallo di 12 h col prodotto sciolto in acqua e/o latte (sostituto del latte) a 40°C.

Mescolare e somministrare all'animale immediatamente prima che la soluzione gelifichi.

▪ Vitelli e Puledri:

100 g diluiti in 2 L massimo per dose.

▪ Agnelli e capretti:

25 g diluiti in 500 ml massimo per dose.

IL TEMPO TRA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE IMMEDIATO (PREPARARE DAVANTI ALL'ANIMALE DA TRATTARE)

Periodo di utilizzo raccomandato

Da 1 a 7 giorni (da 1 a 3 giorni se costituisce l'alimento esclusivo dell'animale).

Presentazione

Barattolo da 1 Kg con dosatore da 25 g (se riempito a raso).

* ai sensi del Reg. (UE) n.1123/2014

