

LENDUE

(Mebendazolo)
Antelmintico polivalente

Nome e indirizzo del titolare dell'A.I.C e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Teknofarma S.r.l. - Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n° 14 - Torino

Denominazione del medicinale veterinario

LENDUE Compresse, 240 mg, compresse masticabili per gatti e cani di piccola e media taglia.

LENDUE MAXI Compresse, 480 mg, compresse masticabili per cani di grossa taglia.

LENDUE Gocce, 120 mg/g, sospensione orale per gatti e cani di piccola e media taglia.

Indicazione dei principi attivi e degli altri ingredienti

LENDUE COMPRESSE

Una compressa contiene:

Principio attivo: Mebendazolo micronizzato mg 240 - Eccipienti q.b.

LENDUE MAXI COMPRESSE

Una compressa contiene:

Principio attivo: Mebendazolo micronizzato mg 480 - Eccipienti q.b.

LENDUE GOCCE

100 g di sospensione contengono:

Principio attivo: Mebendazolo micronizzato g 12 - Eccipienti q.b. a g 100

Indicazioni

Infestioni parassitarie sostenute da: *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense*, *Uncinaria stenocephala*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Toxocara cati*, *Trichuris vulpis*, *Strongyloides stercoralis*, *Taenia* spp..

Controindicazioni

Nessuna.

Reazioni avverse

Nessuna nota. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informare il veterinario.

Specie di destinazione

LENDUE Compresse e LENDUE Gocce: gatti e cani di piccola e media taglia.

LENDUE MAXI Compresse: cani di grossa taglia.

Posologia per ciascuna specie, via e modalità di somministrazione

Per uso orale.

Somministrare 30 mg/Kg p.v./die di Mebendazolo:

- per due giorni consecutivi, nelle infestioni sostenute da *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense*, *Uncinaria stenocephala*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Toxocara cati*, *Trichuris vulpis*, *Strongyloides stercoralis*, *Taenia* spp., sia singole che miste;
- per un giorno solo, nelle infestioni sostenute da soli vermi ematofagi *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense*, *Uncinaria stenocephala*.

Questa posologia corrisponde a:

LENDUE COMPRESSE Per gatti e cani di piccola e media taglia	LENDUE MAXI COMPRESSE Per cani di grossa taglia	LENDUE GOCCE Per gatti e cani di piccola e media taglia
Una compressa ogni 8 Kg di peso animale al giorno. La compressa è agevolmente divisibile in quattro parti utilizzabili ognuna per trattare 2 Kg di animale.	Una compressa ogni 16 Kg di peso animale al giorno. La compressa è agevolmente divisibile in quattro parti utilizzabili ognuna per trattare 4 Kg di animale.	8 gocce per Kg di peso animale al giorno. Una goccia di sospensione contiene 3,75 mg di sostanza attiva. Il Lendue gocce può essere somministrato ai cuccioli anche nelle prime settimane di vita senza inconveniente alcuno. Le gocce risultano appetibili agli animali; possono essere somministrate direttamente in bocca o incorporate con del cibo gradito.
Le compresse, masticabili, risultano appetibili agli animali e vengono assunte spontaneamente salvo rare eccezioni; in questi casi possono essere sbriciolate o incorporate in una piccola quantità di alimento gradito o camuffate insieme ad altre crocchette.		
Arrotondare sempre il peso dell'animale al numero intero superiore.		
Con la somministrazione del Lendue secondo le modalità indicate, si ottiene la totale scomparsa dei parassiti adulti; per eliminare le forme larvali è necessario ripetere il trattamento completo dopo 60 gg per le infestazioni da Ascaridi e dopo 18 gg per quelle da Anchiostomi dal termine del primo trattamento.		

Avvertenze per una corretta somministrazione

LENDUE Gocce: agitare molto energicamente prima dell'uso fino a ridispersione totale del sedimento.

Vedi anche "Avvertenze speciali"

Tempo di attesa

Non pertinente.

Particolari precauzioni per la conservazione

LENDUE Compresse e LENDUE MAXI Compresse: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente e al riparo dalla luce - Conservare nel contenitore originale e tenere il flacone ben chiuso.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

LENDUE Gocce: conservare a temperatura ambiente - Tenere il flacone ben chiuso.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta e sulla scatola.

Avvertenze speciali

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Al fine di ottenere un efficace controllo dei parassiti, il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico delle feci.

Non è necessario far osservare il digiuno all'animale durante il trattamento; è buona norma comunque, durante le sverminazioni, e già fin dal giorno precedente, somministrare all'animale pasti ridotti e più leggeri del solito. E' preferibile somministrare il farmaco a stomaco vuoto.

Già fin dalla prima somministrazione ha inizio l'eliminazione dei parassiti; la scomparsa delle uova si ha di solito entro 10 - 15 giorni dall'ultima somministrazione. Pertanto l'esame delle feci per controllo dovrà essere effettuato dopo che sia trascorso il suddetto periodo di tempo.

Durante il trattamento ed anche successivamente è necessario effettuare, specialmente nei cani o negli allevamenti, le opportune operazioni di disinfestazione dei locali al fine di evitare le reinfestazioni. Inoltre è opportuno venga effettuata la denaturazione chimica delle feci espulse dai soggetti trattati al fine di distruggere eventuali parassiti vivi emessi e così interrompere la continuazione del ciclo parassitario.

Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Nessuna.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Nessuna.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

Non somministrare il LENDUE nei primi quindici giorni di gravidanza. In assenza di studi sulla specie di destinazione somministrare nei rimanenti 45 giorni di gravidanza e durante l'allattamento solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Nessuna conosciuta.

Sovradosaggio

La somministrazione di dosi eccessive non provoca nessun sintomo se non il vomito oltre i 500 mg/Kg di principio attivo nel cane e 300 mg/Kg di principio attivo nel gatto.

Incompatibilità

LENDUE Compresse e LENDUE MAXI Compresse: non pertinente.

LENDUE Gocce: non note. In assenza di studi di compatibilità, non miscelare con altri medicinali.

Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

Settembre 2020

Altre informazioni

Caratteristiche farmacologiche

Le elmintiasi sono molto comuni sia nel cane che nel gatto e sono sostenute da parassiti appartenenti sia ai nematelminti (vermi tondi) che ai platelminti (vermi piatti) o a entrambe le specie contemporaneamente.

Il LENDUE è attivo su tutti i nematodi e sulle Taenie spp. che infestano comunemente il cane e il gatto. L'attività del Mebendazolo sul Dypilidium caninum è invece incostante.