



SODIO CLORURO 0,9% ACME

soluzione per fusione per cavalli, bovini, cani e gatti - 9 g/l
sacca in PVC free da 500 ml

Composizione: 1000 ml contengono: Sodio Cloruro 9,0 g. **Concentrazione elettrolitica:** Sodio (Na⁺) 154 mEq/l, Cloro (Cl⁻) 154 mEq/l. **Osmolarità teorica:** 308 mosm/l, pH: 4,50-7,00. Soluzione sterile, limpida, incolore, priva di particelle, apirogena e isotonica con il sangue. **Specie di destinazione:** Cavallo, bovino, cane e gatto. **Indicazioni per l'uso:** Cavalli, bovini, cani e gatti: reidratante, elettrolitico. **Controindicazioni:** Non usare negli animali con ipernatremia. Non usare in caso di iperidratazione. **Avvertenze speciali:** Non usare se la soluzione non è perfettamente limpida e priva di particelle visibili. Prima dell'uso accertarsi dell'integrità del contenitore. Non usare se il contenitore non è integro. Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione: Nei casi di correzione del deficit di elettroliti liquidi intracellulari, occorre tenere presente l'inadeguatezza della soluzione "fisiologica" o di soluzioni più concentrate contenenti solo sodio e cloro. Infatti, l'uso di dette soluzioni può, in queste circostanze, aumentare i deficit intracellulari. Per esempio, se viene somministrata una soluzione di cloruro di sodio ad un animale depleto di potassio, il potassio cellulare perduto può essere sostituito dal sodio, il quale aggrava ulteriormente il quadro già anormale degli elettroliti cellulari, inibendo la funzione cellulare. In questi casi vanno usate adatte soluzioni di ripristino che forniscano sia elettroliti extracellulari che quelli intracellulari. Qualsiasi soluzione contenente sodio deve essere usata con precauzione negli animali con tendenza a trattenere sale, per scompenso cardiaco, disturbi epatici o blocco renale. Il sodio cloruro va somministrato con cautela nell'insufficienza cardiaca congestizia, edemi periferici o polmonari, funzione renale indebolita o pre-eclampsia, in pazienti in trattamento con farmaci corticosteroidi o corticotropinici. Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali: Si raccomanda durante la manipolazione del medicinale veterinario di seguire tutte le appropriate precauzioni igieniche di asepsi per evitare la contaminazione della soluzione. Gravidanza e allattamento: Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile. Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione: Somministrare con cautela in animali in trattamento con medicinali corticosteroidi e corticotropinici. Sovradosaggio: L'eccessiva somministrazione di NaCl può dare edema e rende necessaria una somministrazione supplementare di potassio; essa inoltre provoca ipernatremia. Principale conseguenza di ciò è la disidratazione di organi interni (es: cervello) che, a sua volta, può portare a trombosi ed emorragie. In presenza di un eccesso di NaCl i principali effetti indesiderati sono: nausea, vomito, diarrea, sete, riduzione della salivazione, febbre, ipotensione, tachicardia, insufficienza renale, edemi polmonari e periferici, arresto cardiaco, debolezza, contrazioni e rigidità muscolare, convulsioni, coma e morte. Restrizioni speciali per l'uso e condizioni speciali per l'impiego: Non pertinente. Incompatibilità principali: In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari. **Eventi avversi:** Cavallo, bovino, cane e gatto

Frequenza indeterminata (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Risposte febbrili. Infezioni al punto di inoculo. Trombosi venose, flebiti

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questo foglio illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati alla fine di questo foglio o tramite il sistema nazionale di segnalazione: <https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria>

Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione: Uso: endovenoso, intradermico, intraperitoneale. Posologia: Cavalli adulti e bovini: 2000 - 30000 ml al giorno. Puledri e vitelli: 2000 - 15000 ml al giorno. Cani: 150 - 3000 ml al giorno. Gatti: 10 - 300 ml al giorno. Raccomandazioni per una corretta somministrazione: Il bilancio dei fluidi e i livelli degli elettroliti sierici devono essere monitorati con attenzione durante il trattamento. **Tempi di attesa:** Cavalli e bovini: zero giorni. Cani e gatti: non pertinente.

Precauzioni speciali per la conservazione: Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non conservare a temperatura superiore ai 25° C. Non congelare. Dopo l'apertura usare immediatamente e non conservare. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. **Classificazione dei medicinali veterinari:** Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione. A.I.C. n. 100353162 GTIN 08008448001957. Data dell'ultima revisione dell'etichetta: 05/2026. **Solo per uso veterinario.** Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it/>). **Recapiti:** Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e recapiti per le segnalazioni di sospetti eventi avversi: ACME srl via Libero Grassi 9, IT-42025 Cavriago (RE). Tel. +39 0522941919, e-mail: farmacovigilanza.acme@acmeanimalcare.com.

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: S.A.L.F. S.p.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO, Cenate Sotto (BG).

JSASC05ACMF NO-6642FA1 r1 Sam