RINGER LATTATO ACME

soluzione per infusione per cavalli, bovini, cani e gatti

sacca in PVC free da 1000 ml

Composizione: Ogni ml contiene: Acido lattico mg 2,60 - Sodio idrossido mg 1,17- Sodio cloruro mg 6,00 - Potassio cloruro mg 0,40 - Calcio cloruro mg 0,204 come calcio cloruro biidrato mg 0,27. mEq/l: (Na^+)132 - (K^+)5 - (Ca^+)4 - (Cl^-)112 - (Lattato come HCO_3^-) 29.0. mOsm/l (teor.): 280 pH 5.5/7.0. Soluzione sterile, apirogena, isotonica, limpida e incolore. **Specie di destinazione:** Cavallo, bovino, cane e gatto.

Indicazioni per l'uso: Reidratazione nella terapia sostitutiva parenterale delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti; alcalinizzante quando è necessario correggere stati acidosici lievi o moderati. **Controindicazioni:** Non usare in animali con insufficienza cardiaca, condizioni associate ad iperkalemia. Usare con cautela in caso di scompenso cardiaco congestizio, insufficienza renale grave e in stati clinici associati a edemi e ritenzione idrosalina. insufficienza epatica. Non usare in casi in cui il metabolismo del lattato è gravemente compromesso, come avviene nelle disfunzioni epatiche o negli stati di anossia da shock o scompenso cardiaco. Non usare in animali con acidosi metabolica grave. Non usare in animali con alcalosi metabolica grave. Non usare in concomitanza con trasfusione di sangue, nella stessa via venosa, a causa del rischio di coagulazione. **Avvertenze speciali:** Usare per una sola ed ininterrotta somministrazione. Non riutilizzare residui. Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione: Viene consigliata "una somministrazione in vene di grosso calibro a velocità perfusionale controllata". La soluzione rimane nello spazio extracellulare: va, quindi, somministrata con cautela quando vi sia tendenza a ipervoliemia come ad esempio nei disturbi cardiaci, renali, epatici. Usare con cautela in pazienti in trattamento con farmaci ad azione inotropa cardiaca o con farmaci corticosteroidei o corticotropinici. Monitorizzare il bilancio dei fluidi, gli elettroliti e l'equilibrio acido-base. Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali: Non pertinente. Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente: Non pertinente. Gravidanza e allattamento: Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio rischio del medico veterinario responsabile. Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione: Dati non disponibili. Sovradosaggio: Il sovradosaggio può causare sovraccarico cardiovascolare ed edema polmonare che può portare ad irrequietezza, tosse e poliuria. In caso di overdose la velocità di infusione dovrebbe essere drasticamente ridotta o l'infusione interrotta. Restrizioni speciali per l'uso e condizioni speciali per l'impiego: Non pertinente. Incompatibilità principali: Non miscelare con farmaci a base di bicarbonato, fosfati, solfati e tetracicline.

Eventi avversi: Cavallo, bovino, cane e gatto:

Frequenza indeterminata (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)	• Trombosi • Flebiti • Necrosi tissutale

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questa etichetta, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati in questa etichetta o tramite il sistema nazionale di segnalazione: https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria.

Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione: Uso endovenoso, sottocutaneo, intraperitoneale. Posologia: Cavalli e bovini: 3000 – 30000 ml al giorno; Puledri e vitelli: 1500 – 15000 ml al giorno; Cani: 150 – 3000 ml al giorno; Gatti: 10 – 300 ml al giorno. **Raccomandazioni per una corretta somministrazione:** Usare per una sola e ininterrotta somministrazione. Viene consigliata "una somministrazione in vene di grosso calibro a velocità perfusionale controllata". Non riutilizzare residui. **Tempi di attesa:** Cavalli e bovini: Carni e frattaglie: zero giorni. Latte: zero ore. **Precauzioni speciali per la conservazione:** Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non conservare a temperatura superiore ai 25° C. Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla sacca. **Precauzioni speciali per lo smaltimento:** I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Chiedere al proprio medico veterinario o al proprio farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. **Classificazione dei medicinali veterinari:** Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione. **A.I.C. n. 100351156 GTIN 08008448004521**. **Data dell'ultima revisione dell'etichetta:** 05/2026. Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella Banca dati dei medicinali dell'Unione (https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it). **Recapiti:** Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e recapiti per la segnalazione di sospetti eventi avversi: ACME s.r.l. Via Libero Grassi, 9 IT – 42025 Cavriago (RE) – Italy Tel. +39 0522941919 email: farmacovigilanza.acme@acmeanimalcare.com. Fabbricante responsabile del rilascio del lotto: S.A.L.F. S.p.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO, Cenate Sotto (BG). **Solo per uso veterinario.** Dopo la perforazione, usare immediatamente.

JSA1RLACMF NO-6108A1 r1 Sam