

NANUT®

MANGIME COMPLEMENTARE D'ALLATTAMENTO PER CANI E GATTI

Istruzioni per un uso corretto nei cani



Utilizzare il misurino grande per cani.

Sciogliere la polvere di latte nell'acqua (250 ml di acqua calda per ogni misurino) mescolando accuratamente fino ad ottenere una soluzione omogenea. Somministrare l'alimento preparato alla temperatura di 38-40 °C per mezzo di un biberon. Osservare norme igieniche adeguate lavando i recipienti utilizzati dopo ogni pasto e buttare il latte eventualmente avanzato. Nei cani adulti Nanut può essere aggiunto in polvere all'alimento.

La somministrazione simultanea di vitamina D2 è vietata.

Cuccioli: la quantità di latte e il numero dei pasti variano a seconda del peso alla nascita e all'età.

Cuccioloni e cani adulti: aggiungere all'abituale alimento un quarto, un mezzo o un misurino intero a seconda della taglia piccola, media o grande.

Femmine gravide: un misurino di NANUT in sostituzione di 50 g dell'abituale alimento.

Femmine in lattazione: 1 o 2 misurini di polvere al giorno a seconda della taglia del soggetto ed il numero di cuccioli allattati in aggiunta all'abituale alimento.

TABELLA DI RAZIONAMENTO PER CANI

Peso del cucciolo alla nascita g		Età del cucciolo			
		1° - 2° giorno	3° - 7° giorno	8° - 16° giorno	17° - 30° giorno*
50-150	Quantità di latte ricostituito per pasto in ml	12	15	25	60
	Numero di pasti per giorno	8	8	6	4
150-250	Quantità di latte ricostituito per pasto in ml	24	30	60	120
	Numero di pasti per giorno	8	8	6	4
250-350	Quantità di latte ricostituito per pasto in ml	36	45	85	160
	Numero di pasti per giorno	8	8	6	4
350-500	Quantità di latte ricostituito per pasto in ml	50	60	110	240
	Numero di pasti per giorno	8	8	6	4
500-750	Quantità di latte ricostituito per pasto in ml	80	100	185	360
	Numero di pasti per giorno	8	8	6	4
750-1000	Quantità di latte ricostituito per pasto in ml	110	150	270	520
	Numero di pasti per giorno	8	8	6	4

*Dal 30° giorno di vita integrare la dieta latte con alimenti semisolidi per iniziare lo svezzamento

NANUT[®]

MANGIME COMPLEMENTARE D'ALLATTAMENTO PER CANI E GATTI

Istruzioni per un uso corretto nei gatti

Utilizzare il misurino piccolo per gatti. 

Sciogliere la polvere di latte nell'acqua (25 ml di acqua calda per ogni misurino) mescolando accuratamente fino ad ottenere una soluzione omogenea. Somministrare l'alimento preparato alla temperatura di 38-40 °C per mezzo di un biberon. Osservare norme igieniche adeguate lavando i recipienti utilizzati dopo ogni pasto e buttare il latte eventualmente avanzato. Nei gatti adulti Nanut può essere aggiunto in polvere all'alimento.

La somministrazione simultanea di vitamina D2 è vietata.

Gattini poppanti: la quantità di latte e il numero dei pasti variano a seconda del peso alla nascita e all'età.

Gatti adulti: aggiungere all'abituale alimento 2 misurini di polvere al giorno.

Femmine gravide: 2 misurini di NANUT al giorno in sostituzione di 10 g dell'abituale alimento.

Femmine in lattazione: 2 o 3 misurini di polvere al giorno in aggiunta all'abituale alimento, a seconda della taglia del soggetto ed il numero di gattini allattati.

TABELLA DI RAZIONAMENTO PER GATTI

Età del gatto	1° - 2° giorno	3° - 7° giorno	8° - 16° giorno	Dal 16° al 30° giorno*
Quantità di latte ricostituito per pasto in ml	4	8	15	20
Numero di pasti per giorno	8	6	5	4

*Dal 30° giorno di vita integrare la dieta latte con alimenti semisolidi per iniziare lo svezzamento