

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

1. Denominazione del medicinale veterinario

Purrfit Combo 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti

2. Composizione

Ogni pipetta da 0,5 ml contiene:

Sostanze Attive:

Fipronil	50,00 mg
(S)-methoprene	60,00 mg

Eccipienti:

Butilidrossianisolo (E320)	0,10 mg
Butilidrossitoluene (E321)	0,05 mg

Soluzione limpida color ambra

3. Specie di destinazione

Gatto  e furetto. 

4. Indicazioni per l'uso

Nei gatti:

- Da utilizzare contro le infestazioni da pulci, da sole o associate a zecche e/o pidocchi masticatori.
- Eliminazione delle pulci (della specie *Ctenocephalides* spp.). Prevenzione di nuove infestazioni da pulci adulte per 4 settimane. Prevenzione della moltiplicazione delle pulci mediante il blocco dello sviluppo di uova, larve e pupe originate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per sei settimane dopo l'applicazione.
- Eliminazione delle zecche (delle specie *Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*) fino a 2 settimane.
- Eliminazione dei pidocchi masticatori (della specie *Felicola subrostratus*).

Il medicinale veterinario può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite Allergica da Pulce (DAP).

Nei furetti:

- Da usare contro le infestazioni da pulci, da sole o associate a zecche.
- Eliminazione delle pulci (della specie *Ctenocephalides* spp.). Prevenzione di nuove infestazioni da pulci adulte per 4 settimane. Prevenzione della moltiplicazione delle pulci mediante il blocco dello sviluppo di uova, larve e pupe originate dalle uova deposte dalle pulci adulte.
- Eliminazione delle zecche (della specie *Ixodes ricinus*) per 4 settimane

5. Controindicazioni

In assenza di dati disponibili, il medicinale veterinario non deve essere usato nei gattini di età inferiore alle 8 settimane e/o di peso inferiore a 1 kg. Non usare il medicinale veterinario in furetti di età inferiore ai 6 mesi.

Non usare in animali malati (es. malattie sistemiche, febbre) o convalescenti.

Non usare nei conigli, poiché potrebbero manifestarsi eventi avversi potenzialmente mortali.

In assenza di studi, si raccomanda di non usare il medicinale veterinario in specie diverse da quelle di destinazione.

6. Avvertenze speciali

Avvertenze speciali:

Evitare il contatto con gli occhi dell'animale.

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione:

È importante assicurarsi che il medicinale veterinario sia applicato in una zona del corpo in cui l'animale non riesca a leccarsi e che gli animali non si lecchino a vicenda dopo il trattamento.

Non sono disponibili informazioni sull'efficacia del medicinale veterinario nei gatti e nei furetti a seguito di bagni/shampoo. Tuttavia, basandosi sulle informazioni disponibili per i cani lavati dopo 2 giorni dall'applicazione del medicinale veterinario, non è raccomandato fare il bagno agli animali nei due giorni successivi l'applicazione del medicinale veterinario.

Singole zecche potrebbero attaccarsi all'animale dopo il trattamento. Per questa ragione, in condizioni sfavorevoli, non può essere completamente esclusa la trasmissione di malattie infettive.

Le pulci presenti sugli animali spesso infestano la cuccia dell'animale, le coperte e le abituali zone in cui riposa l'animale come tappeti e tessuti di arredamento che, in caso di infestazioni massive e all'inizio del trattamento antiparassitario, devono essere trattati con un apposito insetticida ed essere regolarmente ripuliti con un aspiratore.

La potenziale tossicità del medicinale veterinario nei gattini di età inferiore alle 8 settimane a contatto con la madre trattata con il medicinale veterinario non è documentata. Si consiglia, in tal caso, di prestare particolare attenzione.

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Questo medicinale veterinario può provocare irritazione alle mucose, alla pelle e agli occhi. Evitare quindi il contatto del medicinale veterinario con la bocca, la pelle e con gli occhi.

Le persone con nota ipersensibilità agli insetticidi o all'alcool devono evitare contatti con il medicinale veterinario. Evitare che il contenuto venga a contatto con le dita. In tal caso, lavare immediatamente le mani con acqua e sapone.

In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente gli occhi con acqua pulita.

Lavare le mani dopo l'uso.

Non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a che il sito di applicazione non sia asciutto. Si raccomanda pertanto di non trattare gli animali durante il giorno, ma a inizio sera e di non permettere agli animali trattati di recente di dormire con i proprietari, specialmente con i bambini.

Non fumare, bere o mangiare durante l'applicazione.

Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente:

Il medicinale veterinario non deve essere disperso nei corsi d'acqua, poiché fipronil e (S)-methoprene potrebbero essere pericolosi per i pesci o per altri organismi acquatici.

Gravidanza e allattamento:

Gatti

Può essere usato durante la gravidanza. È importante assicurarsi che il medicinale veterinario sia applicato in una zona del corpo in cui l'animale non riesca a leccarsi e che gli animali non si lecchino a vicenda dopo il trattamento. La potenziale tossicità del medicinale veterinario nei gattini di età inferiore alle 8 settimane a contatto con la madre trattata con il medicinale veterinario non è documentata. Si consiglia, in tal caso, di prestare particolare attenzione.

Furetti

Studi di laboratorio sui gatti non hanno mostrato alcuna evidenza di effetti teratogenici, fetotossici o maternotossici. Non è stata stabilita la sicurezza del medicinale veterinario su furette gravide e in allattamento. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del medico veterinario responsabile.

Interazione con altri medicinali veterinari e altre forme di interazione:

Nessuna nota.

Sovradosaggio:

Gatti

Negli studi di sicurezza nelle specie di destinazione non sono stati osservati effetti avversi nei gatti e nei gattini di età uguale o superiore a 8 settimane e con peso di circa 1 kg, trattati una volta al mese per sei mesi consecutivi con dosi cinque volte superiori alla dose raccomandata.

Dopo il trattamento può manifestarsi prurito.

L'applicazione di una dose superiore a quella raccomandata di questo medicinale veterinario può determinare un aspetto umido e appiccicoso del pelo nel sito di applicazione. Comunque, se ciò dovesse verificarsi, scomparirà nell'arco di 24 ore dall'applicazione.

Furetti

Nei furetti di età uguale o superiore a 6 mesi e trattati ogni 2 settimane per quattro volte, a dosi cinque volte superiori alla dose raccomandata, si è osservata in alcuni soggetti una diminuzione del peso animale.

Incompatibilità principali:

Nessuna nota.

7. Eventi avversi

Gatti

Molto rari (< 1 animale / 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate)
Reazioni al sito di applicazione ¹ (dessquamazione, perdita di pelo ² , prurito, arrossamento); Prurito generalizzato, perdita generale di pelo; Ipersalivazione ³ , vomito; Sintomi nervosi ⁴ (aumentata sensibilità agli stimoli, depressione, altri segni nervosi).

¹ Transitorio.

² Localizzato.

³ Qualora l'animale si lecchi, si può osservare una transitoria ipersalivazione dovuta principalmente agli eccipienti del prodotto.

⁴ Reversibile.

Furetti: Nessuna conosciuta.

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o il suo rappresentante locale utilizzando i recapiti riportati alla fine di questo foglietto o tramite il sistema nazionale di segnalazione: <https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria>.

8. Posologia per ciascuna specie, via(e) e modalità di somministrazione

Uso spot-on.

Una pipetta da 0,5 ml per gatto, per applicazione topica cutanea.

L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.

Una pipetta da 0,5 ml per furetto, corrispondente a 50 mg di fipronil e 60 mg di (S)-methoprene per furetto, per applicazione topica cutanea.

L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.

Non sovradosare.

Modalità di somministrazione:

Tenere la pipetta in posizione verticale. Picchiare leggermente sulla parte stretta della pipetta in modo che il liquido contenuto rimanga nella parte larga della pipetta. Rompere l'estremità pre-tagliata. Separare i peli alla base del collo, sul dorso dell'animale, tra le scapole, e mettere in evidenza la cute.

Porre la punta della pipetta a diretto contatto con la cute in un solo punto e schiacciare la pipetta più volte fino al suo completo svuotamento.

9. Raccomandazioni per una corretta somministrazione

Eliminare le pipette aperte.

10. Tempi di attesa

Non pertinente

11. Precauzioni speciali per la conservazione

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare nel contenitore originale per proteggere il medicinale veterinario dalla luce.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta e sulla scatola dopo Exp. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

12. Precauzioni speciali per lo smaltimento

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Il medicinale veterinario non deve essere disperso nei corsi d'acqua, poiché fipronil e (S)-methoprene potrebbero essere pericolosi per i pesci o per altri organismi acquatici.

Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente.

Chiedere al proprio medico veterinario o al proprio farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

13. Classificazione dei medicinali veterinari

Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione

14. Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio e confezioni

Scatola di cartone contenente 1 pipetta A.I.C. n. 105126015

Scatola di cartone contenente 3 pipette A.I.C. n. 105126027

Scatola di cartone contenente 6 pipette A.I.C. n. 105126116

Confezioni

Scatole da 1,3 e 6 pipette, in bustine singole.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

15. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

04/2025

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it>).

16. Recapiti

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, fabbricante responsabile per il rilascio dei lotti:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co. Galway.
Irlanda

Rappresentanti locali e recapiti per la segnalazione di sospetti eventi avversi:

Elanco Italia S.p.A,
Via dei Colatori 12
50019 - Sesto Fiorentino (FI)
Italia
Tel.: +39 0282944231
E-mail: PV.ITA@elancoah.com

17. Altre informazioni