



neo Foractil SPRAY

10 mg/g + 3 mg/g + 2 mg/g
soluzione spray per uso esterno

Per uccellini da gabbia e da voliera,
cani, gatti e conigli da compagnia

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE

Titolare dell'autorizzazione all'immissione

in commercio:

FORMEVET S.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax: +39 02 43458922

e-mail: vetline@formevet.it

Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

TOSVAR S.r.l.

Via del Lavoro, 10 - Pozzo D'Adda Milano - Italia

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

NEO FORACTIL Spray

10 mg/g + 3 mg/g + 2 mg/g soluzione spray per uso esterno.

Per uccellini da gabbia e da voliera, cani, gatti e conigli da compagnia.

Piperonil butossido + permetrina + tetrametrina.

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

1 g di prodotto contiene: principi attivi: piperonil butossido 10 mg, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 3 mg, tetrametrina 2 mg;

eccipienti: acetone, alcool isopropilico, essenza balsamica, butano/propano (3,2-3,5).

INDICAZIONI

Ectoparassitocida ad esclusivo uso esterno sugli animali, contro acari, pulci e pidocchi.

CONTROINDICAZIONI

Non usare su cuccioli di cane e coniglietti di età inferiore a 3 mesi; non usare sui gatti di età inferiore a 1 anno.

Non utilizzare su animali malati, convalescenti o con estese lesioni della pelle.

Non usare in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

REAZIONI AVVERSE

In soggetti predisposti si possono manifestare eventi allergici. Nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, sospendere il trattamento.

L'uso, specie se prolungato, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In caso di sovradosaggio potrebbero verificarsi: eccesso di salivazione, secrezioni respiratorie, tremori, convulsioni, fascicolazioni (vedere anche la sezione Sovradosaggio).

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Uccellini da gabbia e da voliera, cani, gatti e conigli da compagnia.

POSOLOGIA, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Cane: da 2 a 4 ml di prodotto/kg, a seconda della lunghezza del pelo, pari a circa 2-4 secondi di erogazione dello spray/kg.

L'intervallo tra un trattamento e il successivo non dovrebbe essere inferiore alle 3-4 settimane.

Gatto: 2 ml di prodotto/kg, pari a circa 2 secondi di erogazione dello spray/kg. L'intervallo tra un trattamento e il successivo deve essere di almeno 4 settimane.

Coniglio da compagnia: 3 ml di prodotto/kg, pari a circa 3 secondi di erogazione dello spray/kg.

L'intervallo tra un trattamento e il successivo dovrebbe essere di 3-4 settimane.

Uccellini da gabbia e da voliera: da 1 a 2 ml di soluzione somministrata per spray per un uccello di 15-20 g a seconda della gravità delle lesioni da acari e insetti parassiti, pari a 1-2 secondi di erogazione dello spray.

L'intervallo tra un trattamento e il successivo dovrebbe essere di 1-2 settimane.

1 ml di prodotto, pari a 1 secondo di pressione dell'ugello, contiene: principi attivi: piperonil butossido 10 mg, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 3 mg, tetrametrina 2 mg.

Spruzzare il prodotto tenendo la bombola a circa 5-10 cm dall'area da trattare.

La speciale valvola permette di dosare il getto senza dispersione.

Vaporizzare a seconda degli animali, evitando gli occhi e la bocca, su piume, manto, orecchie e zampe.

Non superare le dosi consigliate.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere quanto riportato al punto "Controindicazioni", "Posologia, via e modalità di somministrazione" e al punto "Avvertenze speciali" del presente foglietto illustrativo.

TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

PERICOLO. Aerosol estremamente infiammabile.

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori ai 50 °C.

Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.

Non vaporizzare su fiamma libera o altra fonte di accensione.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla confezione dopo Scad.

AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione
Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico veterinario per istituire un'adeguata terapia. Non usare per trattamenti prolungati; dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il veterinario.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno. Nell'uso evitare di spruzzare il prodotto su muso, occhi, mucose e orecchio interno. Non superare le dosi consigliate. Durante i primi giorni di utilizzo si consiglia di controllare l'animale. Non usare il prodotto in quantità eccessiva o impropria. Evitare che l'animale si lecchi il pelo ancora bagnato. Evitare che il prodotto possa essere inalato o ingerito dagli animali. Utilizzare in ambiente ventilato e aerare bene il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Non contaminare alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerli.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Utilizzare un paio di guanti per l'applicazione del prodotto. Evitare di ingerire il prodotto durante il trattamento. Non contaminare con il prodotto cibi, bevande e recipienti destinati a contenerli. Dopo l'impiego, risciacquare le mani con acqua corrente e sapone. In caso di malessere o ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico mostrandogli il contenitore o il foglietto illustrativo. Provoca grave irritazione oculare. Evitare il contatto con gli occhi, il viso e le mucose, non inalare. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua o soluzione fisiologica. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste consultare un medico. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Le persone con nota ipersensibilità a piperonil butossido, permetrina (rapporto cis/trans 25/75), tetrametrina e agli eccipienti devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non sono note interazioni farmacologiche del prodotto, è comunque opportuno non utilizzare il prodotto contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)

In caso di sovradosaggio potrebbero verificarsi:

1. eccesso di salivazione e secrezioni respiratorie: somministrare atropina (0,02-0,5 mg/kg SC);
2. tremori, convulsioni, fascicolazioni: somministrare diazepam (0,5-1,0 mg/kg IV) ripetuta fino ad ottenere l'effetto desiderato e/o metocarbamolo (44 mg/kg IV) o pentobarbitale (3-15 mg/kg IV lenta) da ripetere fino ad effetto per il controllo delle convulsioni e delle fascicolazioni.

L'induzione della diuresi attraverso una fluidoterapia può favorire l'eliminazione dei metaboliti delle sostanze tossiche ed a mantenere/ripristinare l'equilibrio idrosalinico.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Non disperdere il prodotto nei corsi d'acqua, poiché potrebbe essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Dicembre 2014

ALTRE INFORMAZIONI

Proprietà farmacologiche

Gruppo farmacoterapeutico: ectoparassitocidi ad uso topico

Codice ATCvet: QP53AC54

Proprietà farmacodinamiche

NEO FORACTIL Spray è costituito da piretroidi (permetrina e tetrametrina) con attività antiparassitarie, la cui azione viene sinergizzata dal piperonil butossido che ne amplifica l'azione in quanto ne ritarda il metabolismo nell'insetto.

Informazioni farmacocinetiche

I piretroidi sono assorbiti dal tratto gastroenterico se assunti per via orale, oppure sono assorbiti per via percutanea in vario grado quando somministrati direttamente sulla cute. La distribuzione riguarda in genere tutti i tessuti dell'organismo, ma la maggiore affinità privilegia una distribuzione maggiore nei tessuti adiposi. I piretroidi vengono rapidamente biotrasformati e detossificati per ossidazione, idrolisi degli esteri o coniugazione e l'eliminazione avviene attraverso le urine e le feci.

È dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

SOLO PER USO VETERINARIO.

NON CONTIENE GAS PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L'OZONO.

LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA.

Flacone 200 ml – A.I.C. 103249013

Flacone 250 ml – A.I.C. 103249025

Flacone 300 ml – A.I.C. 103249037

Flacone 500 ml – A.I.C. 103249049

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

B/0415