

# VITAMINICO CANDIOLI LIQUIDO

## MANGIME COMPLEMENTARE PER ORNITOLOGIA

### COMPOSIZIONE

Glicerina, Acqua

#### Additivi per kg

- *Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite*  
Vitamina C E300 g 3 - Calcio-D-pantotenato g 1,63 - Nicotinamide g 1,5 - Vitamina E/ alfa-tocoferil acetato racemico g 1,5 - Acido p-amino benzoico g 1,0 - Vitamina B1 g 1,0 - Vitamina B6 g 1,0 - Vitamina K g 0,95 - Vitamina B2 g 0,93 - Vitamina A g 0,03 - Acido Folico g 0,01 - Vitamina D3 g 0,00025 - Vitamina B12 g 0,0001
- *Emulsionanti e agenti stabilizzanti*  
Sorbitan monolaurato g 27
- *Preservanti*  
Metile 4-idrossi benzoato E218 g 0,33 - Propile 4-idrossi benzoato E216 g 0,17

### COMPONENTI ANALITICI

Umidità 45,0% - Protidi grezzi 0,5% - Oli e grassi grezzi 2,5% - Ceneri grezze 0,5% - Fibra grezza 0,2%

### INDICAZIONI

Stati di sovraffaticamento, coadiuvante negli stati di malattie acute e croniche debilitanti, alimentazione insufficiente o unilaterale, disvitaminosi da trattamento con antibiotici e/o chemioterapici, periodo di cova, periodo di cura dei nidiacei, sviluppo dei giovani, invecchiamento precoce, turbe della muta, modificazioni di comportamento.

### MODO D'USO

Uccelli da gabbia e da voliera e colombi da competizione (viaggiatori): somministrare g 11 per Kg di mangime (corrispondenti a 30 gocce ogni 50 g di mangime) oppure g 5,5 per litro di acqua di bevanda (corrispondenti a 15 gocce ogni 50 ml di acqua). Protrarre il trattamento per 10-15 giorni oppure eseguire cicli di 5 giorni alternati a 2 giorni di riposo per 3 volte consecutive. Rinnovare l'acqua di bevanda ogni 24 ore.

### CONFEZIONE

2 formati: flacone da 20 ml e flacone da 200 ml

**SOLO PER USO VETERINARIO  
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI  
CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE**