EQUIMUCIL®

GRANULATO 2,5g/5g

1. Denominazione del medicinale veterinario
EQUIMUCIL GRANULATO 2,5 g/5 g granulato per cavalli

2. Composizione
Ogni bustina da 5 g contiene:
Sostanza attiva:
N-Acetilcisteina 2,5 g
Granulato omogeneo, bianco o quasi bianco.

3. Specie di destinazione
Cavallo

4. Indicazioni per l'uso
Trattamento delle patologie dell'apparato respiratorio dei cavalli in fase acuta, cronica e di esacerbazione o riacutizzazione ed in particolare la broncopneumopatia ostruttiva cronica (COPD).

5. Controindicazioni
Nessuna.
Non usare in casi di ipersensibilità alla sostanza attiva o a uno degli eccipienti.

6. Avvertenze speciali
L'intensa fluidificazione del secreto bronchiale può essere evidenziata da un aumento della tosse, dei rumori respiratori e dello scolo nasale nei primi giorni del trattamento, cui fa seguito, in genere, una loro riduzione fino alla scomparsa, con conseguente detersione delle vie respiratorie.
In caso di processi infettivi in atto è opportuno associare al medicinale veterinario un trattamento antibiotico o sulfamidico. In caso di bronchite cronica, cronica ostruttiva ed in tutti i casi in cui la discrinia si presenti associata a broncospasmo è opportuno abbinare una terapia con broncodilatatori specifici quale ad esempio la teofillina.
Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione:
Non pertinente.
Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:
Le persone con nota ipersensibilità alla N-Acetilcisteina devono somministrare il medicinale veterinario con cautela.
In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.
Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente:
Non pertinente.
Gravidanza e allattamento:
Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.
Interazione con altri medicinali veterinari e altre forme di interazione:
Nessuna nota.
Sovradosaggio:
Non sono stati rilevati sintomi di alcun genere anche in caso di somministrazioni di dosi superiori al dosaggio raccomandato.
Restrizioni speciali per l'uso e condizioni speciali per l'impiego:
Non pertinente.
Incompatibilità principali:
Non pertinente.

7. Eventi avversi
Cavallo: nessuno

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati alla fine di questo foglietto o tramite il sistema nazionale di segnalazione:
https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria

8. Posologia per ciascuna specie, via(e) e modalità di somministrazione
Uso orale.
Posologia:
- Terapia iniziale: somministrare 20 mg di N-Acetilcisteina / kg di peso corporeo al giorno, pari ad una bustina ogni 125 kg di peso corporeo, per 3-5 giorni.
- Terapia di mantenimento: 10 mg di N-Acetilcisteina / kg di peso corporeo al giorno, pari ad una bustina ogni 250 kg di peso corporeo, per 7-10 giorni.

TRATTAMENTO INIZIALE (3-5 giorni)	
PESO CORPOREO (kg)	DOSE
125	1 bustina al dì
250	2 bustine al dì
375	3 bustine al dì
500	4 bustine al dì

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO (7-10 giorni)	
PESO CORPOREO (kg)	DOSE
125	1/2 bustina al dì
250	1 bustina al dì
375	1,5 bustine al dì
500	2 bustine al dì

9. Raccomandazioni per una corretta somministrazione
Per assicurare un corretto dosaggio, determinare il peso corporeo con la massima accuratezza possibile per evitare un sottodosaggio.
Miscelare accuratamente alla razione.

9. Tempi di attesa
Zero giorni.

11. Precauzioni speciali per la conservazione
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non conservare a temperatura superiore a 25 °C.
Conservare in un luogo asciutto.
Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.
La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.
Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

12. Precauzioni speciali per lo smaltimento
I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.
Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente.
Chiedere al proprio medico veterinario o al farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

13. Classificazione dei medicinali veterinari
Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione.

14. Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio e confezioni
Scatola di cartone contenente 20 bustine da 5 g
A.I.C. n. 101001028

15. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo
05/2026

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it).

16. Recapiti
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e recapiti per le segnalazioni di sospette reazioni avverse:
ACME srl
via Libero Grassi 9,
IT-42025 Cavriago (RE)
Tel. +39 0522941919
e-mail: farmacovigilanza.acme@acmeanimalcare.com
Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:
ACME DRUGS srl, via Portella della Ginestra 9/A, 42025 Cavriago (RE)